

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/MRP/09/0028**  
**Exitel Plus tabletes suņiem**

**1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,  
Loughrea,  
Co. Galway,  
Īrija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Exitel Plus** tabletes suņiem.

*Praziquantel, Febantel, Pyrantel*

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

**Exitel Plus** tabletes ir bāli dzeltenas tabletes ar aromatizētāju ar cūkgaļas garšu, ar krustenisku dalījuma līniju vienā pusē. Katra tablete satur 50 mg prazikvantela, 50 mg pirantela (ekvivalents 144 mg pirantela embonāta) un 150 mg febantela. Tableti var sadalīt divās vai četrās vienādās devās..

**4. INDIKĀCIJA(S)**

Suņiem: jauktu nematožu un cestožu invāziju ārstēšanai, ko ierosina sekojošas sugas:

**Nematodes:**

**Cērmes:** *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (pieauguši parazitāri un nenobriedušu kāpuru formas vēlā stadijā).

**Āķtārpi:** *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (pieauguši parazitāri).

**Matgalvji:** *Trichuris vulpis* (pieauguši parazitāri).

**Cestodes:**

**Lenteņi:** *Echinococcus* sugas (*E. granulosus*, *E. multilocularis*), *Taenia* sugas (*T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniformis*), *Dipylidium caninum* (pieauguši parazitāri un nenobriedušu kāpuru formas).

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo var samazināties pirantela un piperazīna prettārpu iedarbība.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Ļoti retos gadījumos novēroti gastrointestināli traucējumi (caureja, vemšana).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

**7. MĒRĶA SUGAS**

Suņi.

## 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES

Vienreizēja deva: **tikai iekšķīgai lietošanai.**

Ieteicamās devas ir: 15 mg/kg ķermeņa svara febantela, 5 mg/kg ķermeņa svara pirantela (ekvivalents 14,4 mg Pirantela embonātam) un 5 mg/kg ķermeņa svara prazikvantela.

**1 Exitel Plus tablete uz 10 kg ķermeņa svara. Tabletes var dot sunim tieši mutē vai piemaisīt barībai.**

**Pirms vai pēc ārstēšanas badošanās nav nepieciešama.**

Tableti var sadalīt divās vai četrās vienādās devās..

Uzturošās devas tabula:

Ķermeņa svars (kg)	Tablete
½ - 2.5	1/4
2.6 -5.0	½
5.1-10.0	1
10.1-15.0	1½
15.1-20.0	2
20.1-25.0	2½
25.1-30.0	3
30.1-35.0	3½
35.1-40.0	4
>40.1	1 tablete uz 10 kg ķermeņa svara

Ja pastāv invāzijas atkārtšanās risks, par atkārotas lietošanas nepieciešamību un tās biežumu konsultējieties ar veterinārārstu.

## 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

## 10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

**Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc “Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.**

**Šīm veterinārajām zālēm nav vajadzīgi īpaši uzglabāšanas apstākļi.**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nekavējoties izmetiet visas neizlietotās salauzto tablešu daļas.

## 12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nelietojiet vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo var samazināties pirantela un piperazīna prettārpu iedarbība.

Vienlaicīga lietošana ar citiem holīnerģiskiem savienojumiem (piem. foksims) var radīt toksicitāti.

Ja neesat pārliecināts, un Jūsu suns lieto citas veterinārās zāles, sazinieties ar veterinārārstu vai farmaceitu.

Blusas ir starpsaimnieki vienam no visbiežāk sastopamajiem lenteņu veidiem — *Dipylidium caninum*. Lenteņu invāzija noteikti radīsies atkārtoti, ja netiks veikta starpsaimnieku, piemēram, blusu, peļu, apkarošana.

Lenteņu invāzija ir maz ticama kucēniem līdz 6 nedēļu vecumam.

Ir ziņots par teratogēnu iedarbību aitām un žurkām, kas saistīta ar augstu febantela devu. Nav veikti pētījumi kucēm agrīnā grūsnības periodā. Zāļu lietošanai grūsnības laikā jābūt saskaņā ar atbildīgā veterinārārsta ieguvuma un riska novērtējumu. Ir ieteicams, ka zāles netiek izmantotas kucēm pirmo 4 grūsnības nedēļu laikā. Nepārsniedziet noteikto devu, ārstējot grūsnas kucis.

Parazītu rezistence pret jebkuru konkrētās grupas antihelmintisku līdzekli var attīstīties pēc biežas, atkārtotas šīs grupas antihelmintisko līdzekļu lietošanas.

#### Piesardzības pasākumi, kas jāievēro lietotājam

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Pareizas higiēnas ievērošanas nolūkā personai, kura dod tabletes tieši sunim vai piemaisa tās suņa barībai, pēc tam jānomazgā rokas.

Lietošanai dzīvniekiem.

Ehinokokoze ir bīstama cilvēkiem. Sakarā ar to, ka par ehinokokozi ir jāziņo Pasaules Dzīvnieku Veselības Organizācijai (Starptautiskajam Epizootiju Birojam (OIE)), specifiskas vadlīnijas par ārstēšanu, apsekošanu un cilvēku drošību jāsaņem no atbilstošajām atbildīgajām institūcijām.

Pārdozēšana:

Suņi labi panes prazikvantela, pirantela embonāta un febantela kombināciju. Lietošanas drošības pētījumos devas, kas 5 reizes vai vairāk pārsniedza ieteicamo devu, biežāk izraisīja gadījuma rakstura vemšanu.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

03/2020

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 un 1000 tabletes.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Bezrecepšu veterinārās zāles.