

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/01/1294

Indigest injectable 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, cūkām un suņiem

1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

LABORATORIOS CALIER, S.A.
Barcelones, 26 (Pla del Ramassa)
08520-Les Franqueses del Valles
Spānija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Indigest injectable 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, kazām, cūkām un suņiem

Menbutone

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens ml šķīduma satur:

Aktīvā viela:

Menbutons 100 mg

Palīgvielas:

Hlorokrezols 2 mg

Dzidrs, viegli iedzeltens šķīdums.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Kuņģa, aizkuņģa dziedzeru un žults sekrēcijas funkciju normalizēšanai, kā arī gadījumos, kad nepieciešams dzīvniekiem stimulēt gremošanas sekrētu izdalīšanos.

Liellopiem:

Gremošanas funkciju traucējumi, toksēmija, ketoze, anoreksija, aknu un aizkuņģa dziedzeru mazspēja.

Aitām un kazām:

Gremošanas funkciju traucējumi, toksēmija, t.sk. grūsnības toksēmija, intoksikācija, aknu un aizkuņģa dziedzeru mazspēja.

Cūkām:

Gremošanas funkciju traucējumi, anoreksija, intoksikācija, aknu un aizkuņģa dziedzeru funkciju traucējumi.

Zirgiem:

Toksēmija, anoreksija, kolikas, aknu un aizkuņģa dziedzeru funkciju traucējumi.

Suņiem:

Gremošanas funkciju traucējumi, toksēmija, anoreksija, aizcietējumi, aknu un aizkuņģa dziedzeru mazspēja.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem ar sirdsdarbības traucējumiem, hipertermijas un žultsvadu obstrukcijas gadījumā. Nelietot kaķiem.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Pēc straujas intravenozas injekcijas var novērot drudzi, paātrinātu elpošanu, spontānu defekāciju, klepu, acu asarošanu, šķaudīšanu un kolapsu.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, aitas, kazas, cūkas, suņi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārai vai intravenozai lietošanai sekojošās devās:

Liellopiem:

20-40 ml Indigest injectable/dzīvniekam, dziļi i.m.vai lēni i.v.

Teļiem:

5-15 ml Indigest injectable/dzīvniekam, dziļi i.m.vai lēni i.v.

Aitām, kazām:

5-10 ml Indigest injectable /dzīvniekam, dziļi i.m.vai lēni i.v.

Cūkām:

1 ml Indigest injectable /10 kg ķermeņa svara, dziļi i.m.vai lēni i.v.

Zirgiem:

20-30 ml Indigest injectable /dzīvniekam, lēni i.v.

Suņiem:

0,1 ml Indigest injectable /kg ķermeņa svara, dziļi i.m.vai lēni i.v.

Ārstēšanas laikā veterinārārstam jānosaka ārstēšanas ilgums atkarībā no atbildes reakcijas un citiem iespējamiem nepanesamības gadījumiem.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Zirgiem veterinārās zāles jāievada lēni intravenozi.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Sargāt no gaismas.

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Uzglabāt sausā vietā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā pēc EXP. Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Lai izvairītos no nevēlamām reakcijām, zāles intravenozi jāievada lēni (ilgāk par minūti).
Intramuskulāri vienā injekcijas vietā neievadīt vairāk kā 20 ml.

Lietošana grūsnības, laktācijas laikā

Nelietot grūsnības pēdējā trimestrī.

Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot vienlaicīgi ar zālēm, kas satur kalciju, prokaīna penicilīnu un B vitamīnu kompleksu.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti)

Metabutona toksicitāte nav pilnīgi izpētīta, tāpēc lietojot jāievēro norādītās devas. Sirdsdarbības traucējumu gadījumā lietot kardiotoniskos līdzekļus.

Nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09/2017

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.