

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/97/0540

### **Alfatrim 24% šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem**

#### **1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Alfasan International BV

Kuipersweg 9

3449 JA Woerden

Nīderlande

#### **2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Alfatrim 24%** šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem

#### **3. AKTĪVO VIELU UN CITĀU VIELU DAUDZUMS**

1 ml šķīduma injekcijām satur:

**Aktīvās vielas:**

Sulfametoksazols            200 mg

Trimetoprimis                40 mg

#### **4. INDIKĀCIJA(-S)**

Liellopiem, cūkām, kaķiem, suņiem:

Pret sulfametoksazolu un trimetoprimu jutīgu ierosinātāju izraisītu elpošanas sistēmas, gremošanas trakta, uroģenitālās sistēmas, acu infekcijas slimību, brūču infekciju ārstēšanai.

Liellopiem:

Pret sulfametoksazolu un trimetoprimu jutīgu ierosinātāju izraisīta mastīta ārstēšanai.

#### **5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

Aknu parenhīmas izmaiņas; asiņu diskrāzija.

#### **6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Reti var būt īslaicīgas sāpes vai diskomforts pēc injekcijas, audu kairinājums injekcijas vietā.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);

- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);

- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu informēties par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi, cūkas, suņi un kaķi.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES**

Intramuskulārām injekcijām.

Liellopi, teļi, cūkas: 1ml uz 20 kg ķermeņa svara (atbilst 10 mg/kg sulfametoksazola un 2 mg/kg trimetoprima), divas reizes dienā 5 dienas;

Vienā injekcijas vietā neievadīt vairāk kā 20 ml zāļu.

Suņi un kaķi: 0,1ml uz 2 kg ķermeņa svara (atbilst 10 mg/kg sulfametoksazola un 2 mg/kg trimetoprima), divas reizes dienā 5 dienas.

Lai nodrošinātu precīzas devas noteikšanu un izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas, ķermeņa svars jānosaka iespējami precīzāk.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Liellopiem, cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas.

Liellopiem:

Pienam: 4 dienas.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25<sup>0</sup> C.

Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem, kā arī jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju izplatība, kas rezistentas pret sulfametoksazolu un trimetoprimu, un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar trimetoprima kombinācijām ar sulfonamīdiem, līdz pat iespējamai krusteniskai rezistencei.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ievērot labu veterināro praksi. Izvairīties no saskares ar šīm zālēm, jo iespējams kontaktdermatīts.

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāizmanto aizsargcimdi.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsniem un laktējošiem dzīvniekiem.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Antagonisms ar penicilīniem un cefalosporīniem.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

**13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS PAMĀCĪBA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

03/2018

**15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.  
Lietošanai dzīvniekiem.