

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/14/0007**  
**Varostop 3,6 mg plāksnītes ievietošanai bišu stropā medus bitēm**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Bičiu Austeja  
Šaltupio g. 24  
29132, Anyksčiai  
Lietuva

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Primavet - Sofia  
Slivnitsa blvd. 211A  
Sofia  
Bulgārija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Varostop** 3,6 mg plāksnītes ievietošanai bišu stropā medus bitēm  
*Flumethrin*

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viena plāksnīte satur:

**Aktīvā viela:**  
Flumetrīns 3,6 mg

Gaiši dzeltenas līdz krēmkrāsas skābarža koka plāksnītes piesūcinātas ar flumetrīnu.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Pret flumetrīnu jutīgu ērcīšu (*Varroa jacobsoni*) ierosinātas varrozes diagnostikai un ārstēšanai medus bitēm.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot zāles medus ienesuma laikā vai pirms medus izņemšanas.  
Nelietot kopā ar citām zālēm, kas paredzētas varrozes ārstēšanai.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Nav zināmas.

**7. MĒRĶA SUGAS**

Medus bites (*Apis mellifera*).

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES**

Lietošanai bišu stropā.

### Deva:

Vienā bišu saimes stropā iekārt 2 - 4 plāksnītes:

- jaunām un nedaudz invadētām bišu saimēm – 2 plāksnītes,
- vidēji invadētām un stipri invadētām bišu saimēm – 4 plāksnītes.

Ārstnieciskās apstrādes laikā plāksnītes stropā atstāj uz 35 dienām, bet ne ilgāk kā uz 6 nedēļām; pēc tam tās ir jāizņem. Plāksnītes iekar starp katru otro kāri stropa pirmajā trešdaļā. Plāksnītes izmantojamas gan pavasara, gan rudens apstrādēm.

### Varrozes diagnostikai:

Uz stropa grīdas ieklāj tīru papīru un uz 24 stundām stropā iekar plāksnītes. Pēc 24 stundām papīru apskatīt un atrodēt beigtas ērces, apstiprina diagnozi.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Skat. 8. punktu.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Medus: nulle dienas.

Nelietot zāles medus ienesuma laikā vai pirms medus izņemšanas.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C. Uzglabāt sausā vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem.

Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

### Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Veterinārās zāles ir jālieto kopā ar terapiju integrētā bišu ērcu apkarošanas programmā, kurā regulāri uzrauga ērcu kritumu. Lai novērstu bišu ērcu rezistences attīstības risku, pamīšus lietojiet šīs veterinārās zāles un citu apstiprinātu varroacīdu ar atšķirīgu darbības mehānismu, kad vien iespējams.

### Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lai novērstu atkārtotu invāziju, vienas dravas visas saimes ir jāārstē vienlaikus. Centieties stropus netraucēt dažas dienas pēc ārstēšanas. Nelietot Varostop, ja ir ievietotas medus kāres.

### Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Strādājot ar plāksnītēm, nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt.

Pēc plāksnīšu izmantošanas un to lietošanas obligāti jānomazgā rokas. Nepieļaut plāksnīšu saskari ar medu, kas paredzēts lietošanai cilvēku uzturā.

## **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Izmantotās vai nevajadzīgās plāksnītes iepakot papīrā un izmest atkritumu tvertnē vai sadedzināt. Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdens tilpēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

11/2018

**15. CITA INFORMĀCIJA**

Bezrecepšu veterinārās zāles.