

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/96/0456**  
**Cefa-Safe 300 mg suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nīderlande

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Cefa-Safe 300 mg suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem**  
*Cefapirinum*

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viens injektors (10 ml) satur :

**Aktīvā viela:**

Cefapirīns (cefapirīna benzatīna formā) 300 mg

**Palīgviela(-s):**

Zemesriekstu eļļa 8590,0 mg

Alumīnija tristearāts 295,0 mg

Krēmveida eļļaina suspensija.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Govīm cietstāves perioda sākumā subklīniskā mastīta ārstēšanai un mastīta novēršanai, kuru ierosina pret cefapirīnu jutīgas baktērijas.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret cefalosporīniem vai citām β-laktāma grupas antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Dažreiz var novērot alerģiskas reakcijas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

**7. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi (govis cietstāves periodā).

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES**

Ievadīšanai tesmenī.

Pēc pēdējās slaukšanas reizes cietstāves perioda sākumā katrā tesmens ceturksnī ievadīt viena injektora saturu.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Pirms lietošanas tesmeņa ceturkšņus rūpīgi izslaukt. Notīrīt un dezinficēt pupa galu, izmantojot iepakojumā iekļautās vienreizējās lietošanas salvetes. Noņemt aizsarguzmavu no injektora kanulas gala. Rūpīgi ievadīt kanulu pupa kanāla atverē. Lēnām izspiest visu injektora saturu pupa kanālā un viegli masēt, lai suspensija izplatītos pa visu tesmens ceturksni virzienā uz augšu.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena.

Pienam: 1 diena pēc dzemdībām, ja cietstāves periods ir ilgāks par 35 dienām;  
36 dienas pēc ārstēšanas, ja cietstāves periods ir 35 dienas vai īsāks.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Šo veterināro zāļu lietošana jāpamato ar no dzīvnieka izolētu mikroorganismu jutības testu rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jāpamato ar reģionālo, saimniecības līmeņa epidemioloģisko situāciju par mērķa baktēriju jutību.

Zāļu lietošana, atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināt rezistentu baktēriju izplatību un samazināt ārstēšanas efektivitāti ar citiem pretmikrobu līdzekļiem, jo ir iespējama krusteniskās rezistences rašanās.

Šīs veterinārās zāles jāizvēlas tikai tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kuros novērojama vāja vai iespējami vāja reakcija uz ārstēšanu ar citu grupu pretmikrobiem līdzekļiem vai šaura spektra  $\beta$ -laktāma grupas pretmikrobiem līdzekļiem.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var novērot nopietnas alerģiskas reakcijas.

Personām, ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.

Ja pēc zāļu lietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja novērojami tādi simptomi kā sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, kas ir daudz nopietnāki simptomi, nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība.

Mazgāt rokas pēc šo veterināro zāļu lietošanas.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības beigu periodā.

Nelietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot cefalosporīnus kombinācijā ar bakteriostatiskas darbības pretmikrobām zālēm, to antagonistiskas darbības dēļ.

**13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

07/2017

**15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojums: kastē 20 injektori un 20 tīrīšanas salvetes.