

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/96/0341

Vitamin AD₃E KRKA injection emulsija injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, trušiem, suņiem un kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOTĀJA LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

KRKA, d.d., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
Slovēnija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vitamin AD₃E KRKA injection emulsija injekcijām liellopiem, zirgiem, cūkām, aitām, kazām, trušiem, suņiem un kaķiem

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Retinola palmitāts (A vitamīns)	50 000 IU
Holekalciferols (D ₃ vitamīns)	25 000 IU
Tokoferola acetāts (E vitamīns)	20 mg

Palīgvielas

Polioksil 35 rīcineļļa, propilēnglikols, glicerīns, bezūdens citronskābe, nātrijs benzoāts, dinātrijs hidrogēnfosfāta dihidrāts, ūdens injekcijām.

4. INDIKĀCIJA(-S)

- Dzīvnieku augšanas un produktivitātes stimulācijai.
- Rezistences palielināšanai pret infekcijām.
- Dzīvnieku vispārējā stāvokļa uzlabošanai.
- Stresa, kas saistīts ar transportēšanu, dzīvesvietas maiņu un līdzīgiem faktoriem, samazināšanai.
- Vitamīnu deficīta profilaksei un terapijai rahīta gadījumā, nepietiekama diēta osteomalācijas gadījumā, atveseļošanās periodā.
- Barošanās traucējumu gadījumos.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta A, D vai E vitamīnu hipervitaminoze.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, cūkas, aitas, kazas, truši, suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES

Intramuskulārai vai subkutānai lietošanai.

Teļiem, kumeljiem	5 – 10 ml vienam dzīvniekam
Zirgiem, liellopiem	10 – 20 ml vienam dzīvniekam
Sivēnmātēm un kuiļiem	10 ml vienam dzīvniekam
Cūkām (50 līdz 100 kg)	4 – 8 ml vienam dzīvniekam
Aitām, kazām	3 – 5 ml vienam dzīvniekam
Jēriem, kazlēniem, sivēniem	1– 2 ml vienam dzīvniekam
Truši	1 ml vienam dzīvniekam
Suņiem, kaķiem	2 – 4 ml vienam dzīvniekam

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā!

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc EXP.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Suņiem un kaķiem ļoti lielas A vitamīna devas var izraisīt skriemeļu saaugšanu.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Atkārtotu devu, kuru lielums pārsniedz terapeitiskās devas, ievade dzīvnieka organismā var radīt kalcija uzkrājumus.

Ļoti retos gadījumos A, D₃ un E vitamīnu injekcijas var izraisīt paaugstinātas jutības (anafilaktiskas) reakcijas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Nav noteikti.

Grūsnība un laktācija:

Zāles ir atļauts lietot laktācijas laikā. Sakarā ar iespējamu A vitamīna teratogēno iedarbību piesardzība ir nepieciešama gadījumos, kad zāles dzīvniekam ievada trīs nedēļas pirms pārošanas vai pirmā grūsnības trimestra laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Retinols var samazināt glikokortikoīdu pretiekaisuma aktivitāti.

Barbiturāti var saīsināt bioloģisko eliminācijas pusperiodu holekalciferolam.

Tokoferols ir spēcīgs selēna jonu iedarbības antagonists.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība atkarībā no situācijas, antidoti):

Kavēta augšana, ķermeņa svara samazināšanās, gingivīts, vemšana, caureja, uzbudināmība, letarģija, hepatomegālija, miopātija, augļa kropļības, skeleta izmaiņas, sirds darbības traucējumi, hiperkalciēmija, hiperfosfatēmija, hipertensija, nieru kalcinoze, hiperalbuminēmija un albuminūrija.

Pārdozēšanu ārstē simptomātiski.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

06/2017

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Flakonos pa 100 ml kartona kastītē.