

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/96/0380**  
**Porcilis APP suspensija injekcijām cūkām**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Intervet International B.V.  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nīderlande

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Porcilis APP** suspensija injekcijām cūkām

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS**

Viena deva (2 ml) satur:

**Aktīvās vielas:**

600 mg *Actinobacillus pleuropneumoniae* antigēnus:

ĀMP (Ārējās membrānas proteīns)	50 vienības
Apx I toksoids	50 vienības
Apx II toksoids	50 vienības
Apx III toksoids	50 vienības

**Adjuvants:**

dl- $\alpha$ -tokoferols	150 mg
--------------------------	--------

**Palīgviela(s):**

Formaldehīds	0,02%
Polisorbāts 80	
Simetikons	

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Atšķirto sivēnu aktīvai imunizācijai, lai ierobežotu pleiropneimoniju, ko ierosina *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Imunitātes iestāšanās: 2 nedēļas pēc otrās vakcinācijas.

Imunitātes ilgums: 11 nedēļas pēc vakcinācijas shēmas pabeigšanas.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nav.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Pēc vakcinācijas pirmās 12 stundas cūkas var izrādīt no vieglas sistēmiskas reakcijas līdz drudzim (temperatūra palielinās par 2°C), nomākumu un anoreksiju. Ja vakcinācijas laikā tām ir pilns kuņģis, dažreiz var novērot vemšanu. Daļai cūku var novērot īslaicīgu vieglu pietūkumu injekcijas vietā. Šīs reakcijas izzūd 24 stundu laikā pēc vakcinācijas.

## 7. MĒRĶA SUGAS

Cūkas (atšķirtie sivēni).

## 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārām injekcijām.

Ievadīt vienu devu 2 ml vakcīnas dziļas intramuskulāras injekcijas veidā cūkām aiz auss.

### Vakcinācijas shēma

Maksimālā aizsardzība ir jāsasniedz pirms nobarošanas perioda sākuma. Sivēnus var vakcinēt no 6 nedēļu vecuma. Nepieciešamas divas vakcinācijas ar ne mazāk kā 4 nedēļu intervālu. Ieteicams tās veikt 6 un 10 nedēļu vecumā.

## 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas atļaut vakcīnai sasilt līdz istabas temperatūrai (15-25 °C).

Izmantot sterilas šļirces un adatas.

Vakcīnu saskalināt pirms un lietošanas laikā.

## 10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc EXP.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 10 stundas.

## 12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai klīniski veselus dzīvniekus.

Nevakcinēt dzīvniekus tūlīt pirms vai pēc ēdināšanas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Nelietot grūsnības un laktācijas laikā.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Ievadot 2 reizes lielāku devu, nav novērotas citas pazīmes kā tās, kuras minētas punktā "Iespējamās blakusparādības".

Nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

04/2018

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Iepakojuma izmēri:

Stikla flakoni, kas satur 1 x 20 ml (10 devas), 1 x 50 ml (25 devas) vai 1 x 100 ml (50 devas).

PET flakoni, kas satur 1 x 20 ml (10 devas), 1 x 50 ml (25 devas) vai 1 x 100 ml (50 devas).

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.