

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

03.05.2023.

50 annust/dozių/devas

Porcilis®  
M Hyo ID  
ONCE


169560 R2

Inaktiveeritud  
*M. hyopneumoniae* tūvi 11:  
≥ 6,5 log<sub>2</sub> Ab tiiter/annus  
Siga.  
Intradermaalne.  
Keeluaeg: 0 päeva.  
Pārast korgi lābistamist  
kasutada 3 tunni jooksul.  
Hoida külmkapis. Mitte  
lasta külmuda.  
Hoida pāikesevalguse eest  
kaitstult.  
Enne ravimi kasutamist  
lugege pakendi infolehte.  
Ainult veterinārseks  
kasutamiseks.  
Hoida laste eest varjatud  
ja kaittesaamatus kohas.

Intervet International B.V.

- Inaktyvintos 11 padermės
- *M. hyopneumoniae*:
- ≥ 6,5 log<sub>2</sub> Ak titro/dozėje
- Kiaulės.
- Švirkšti į odą.
- Išlauka: 0 parų.
- Pradūrus kamštelį,  
sunaudoti per 3 val.
- Laikyti šaldytuve. Negalima  
sušaldyti.
- Saugoti nuo tiesioginių  
saulės spindulių.
- Prieš naudojimą perskaityti  
pakuotės lapelį.
- Tik veterinarijam  
naudojimui.
- Saugoti nuo vaikų.

EE 1685  
LT/2/11/2086/004  
V/DCP/11/0071



*M. hyopneumoniae*  
inaktivēts, celms 11:  
≥ 6.5 log<sub>2</sub> Ab titrs/devā  
Cūkas.  
Intradermālai lietošanai.  
Ierobežojumu periods:  
nulle dienas.  
Pēc pirmreizējas  
caurduršanas izlietot  
3 stundu laikā.  
Uzglabāt ledusskapī.  
Nesalsdēt.  
Sargāt no tiešiem saules  
stariem.  
Pirms lietošanas izlasiet  
lietošanas instrukciju.  
Lietošanai dzīvniekiem.  
Uzglabāt bērniem  
neredzamā un nepieejamā  
vietā.

PSA020028 01 R1  
34x34x67mm  
CMYK

Imprint area  
Varnish free

Lot  
Exp.