

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

04.12.2024.



**Lineomam LC 330 mg/10 ml + 100 000 IU/10 ml šķīdums ievadīšanai tēsnami**  
24 x 10 ml Līncomāms, Neomicīna sulfāts, Viens injekcijas tēsnamam (10 ml) satur:  
Aktīvās vielas: Līncomāms 330 mg (sabalst 359,6 mg līncomāma hidrochlorīda),  
Neomicīna sulfāts 100 000 IU, Palīgvielas: Dvārķis eļļas 4,98 mg, Dzirā,  
bedzārnāms līdz iedabehens skābums, Mērkā suga: Liellopi (lakšņošas piena govīs),  
Indikācijas: Mastīta ārstēšanai, lakšņošas piena govīs, ko izraisa Staphylococcus spp., gūns baktērijas, tostarp S. aureus, Streptococcus spp., gūns baktērijas, tājā skaitā S. agalactiae, S. agalactiae un S. uberis, kā arī koliformās baktērijas, ieskaitot E. coli, kas ir jutīgas pret līncomāma un neomicīna kombināciju. Lietošanas metode un ievadīšanas veids (4): Lietošanai tēsnami -  
Viens dēvs - katrā skrajā tēsnamā ceruam ievadīt 1 injekciju sanurā, t.i., 100 000 IU neomicīna sulfāta un 330 mg līncomāma. Ievadīt abām pusēm pēc 12 stundām.  
Kopumā katrā skrajā ceruam ievadīt 3 dēvas. Veterinārs zāles lieto tikai  
infūzijas tēsnam, ievērojot asprības nosacījumus. Ievadīt tūn, nomazgāt un  
rūpīgi noslaucīt tēsnam, cik drīz vien iespējams pēc pilnīgas ārējā tēsnā  
izskaidāšanas. Pirms ievadīšanas dezinficēt pupa galu ar iepakojumam pievienoto  
dezinfekcijas sāļvēti (katram pupam tēsnamot jāņem sāļvēti). Pirms ievadīšanas  
tūnē injicēšana ar kanulu uz augšu, un sāļi pozīcijā noņemot no kanulas vāciņa. Uzreiz  
pēc ievadīšanas ievadīt injekciju kanulu pupa kanālā un, noņemot vāciņu, iespējams  
pēc injicēšanas sāļvēti skaidri ceruam. Pēc ievadīšanas veidā ievadīt sāļvēti  
pupā galā, kā arī ievadīt sāļvēti pupā galā. Katrā baktērijas tēsnamā  
lieto 84 stundas. **Kontraindikācijas:** Nelietot grūšņām, ja konstatēta pastiprināta jutība  
pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām. **Neirotiskas blakusparādības:**  
Ja novērojot jebkādas blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas  
instrukcijā, vai domājot, ka zāles nav iedarbojušās, lūdz informēt par tām savu  
veterināru. **Īpaši norādījumi Latvijā mērkā sugai:** Nav. **Īpaši norādījumi  
lietošanai dzīvniekiem:** Lietojot šīs veterināras zāles, jāņem vērā vispārējie  
antibiotiku zāļu lietošanas pamatprincipi. Dzirās ES valstīs lielāpū masīva  
gadījumos, kur izolēti Streptococcus uberis un Staphylococcus aureus, ir konstatēta  
ārvien pieaugoša to rezistence pret līncomāmu. Veterināro zāļu lietošana jāpamato  
ar no darvnieka izolēto baktēriju jutības testu rezultātiem. Ja tas nav iespējams,  
ārvešana jābalsta uz vietēja rakstura (reģionālo, novietnes līmeņa) epidemioloģisko  
informāciju par mērkā baktēriju jutību. Lietojot veterināras zāles atbilstīgi no zāļu  
aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju iedarbība, kuras  
rezistence pret līncomāmu vai neomicīnu, un jāpārbauda ārvešanas efektivitāte ar  
makrofilēm un citiem līncomāmiem vai amnoglikozīdiem, kā arī pat iespējama  
krustresistēne. Nelietojiet dezinfekcijas sāļvētes pupiem ar brūcēm. Īpaši  
piecaudības pasākumi, kas jāievēro persona, kurē lieto veterināras zāles dzīvnieku  
ārvešanai: Nerokojieties ar veterinārajām zālēm, ja zinat, ka jums ir pastiprināta  
jutība pret aktīvajām vai palīgvielām, vai jums ir ievērojoties ar sāļi veida  
veterinārajām zālēm. Kļūvojoties ar veterinārajām zālēm, ievērojiet visus ieteiktos  
piesardības pasākumus, lai izvairītos no tiešā kontakta ar tām. Kļūvojoties ar šīm  
veterinārajām zālēm, jāņemamo individuālo aizsargtēp, kas satur no gumijas  
materiāla, jālieto visā darba laikā. Ja zāles ir ievērojoties, jāatbilstoši atbilstoši  
gūdi un zāļu galu, ja kādā laikā zāles ir ievērojoties, jāatbilstoši atbilstoši atbilstoši  
lielu tūluma ārstēšanai. Pēc ārvešanas ar veterinārajām zālēm konstatēta roba, jā  
dezinfekcijas sāļvēti lietošanas noņemot robas, un grūšņām, ja ir zināms  
pastiprināta jutība pret izopropilgrūnu, izņemot aizsargācības. **Grūšņām:** Dzirās  
lieto grūšņām laikā. **Laktācija:** Zāles ir paredzētas lietošanai laktācijas laikā.  
**Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:** Nelietot šīs veterināras  
zāles kopā ar makrofilēm, Līncomāms un makrofilēm, iedarbība ir savstarpēji  
antagonistiska konkurences par piesaistes vietu 50S ribosomu subvienības dēļ, kas ir  
abu molekulu antibakteriālais iedarbības mērķa vieta. Amnoglikozīdi ir sinerģiski  
ar dažām beta-laktāma grupas antibiotikām. Sinerģismam nosaka baktēriju sinerģisk  
bojājumi, ko izraisa beta-laktāma grupas vielas, atbilstoši amino glikozīdu piekļuvei  
baktērijas ribosomas mērķa struktūrai. Šāds mehānisms tika aprakstīts  
streptokoku un grammaņģivām baktēriju. **Pārdozēšana (simptomi, tūlība  
ārvešanas situācijā, antidoti):** Šīm veterinārajām zālēm ir laba panesamība. Nejaunas  
pārdozēšanas gadījumā parast nav sagaidāmas ne lokālas, ne sistēmiskas nevēlamas  
reakcijas. **Nesaderība:** Nav noteikta. **Dzīvās līdz un sērijas Nr.:** šķāt uz  
iepakojuma. **Pēc pirmās tiešā iepakojuma ārvešanas izlietot nekavējoties.**  
**Sargāt no saskaidāšanas. Sargāt no gūšanas.** Atkritumu iznīcināšana: izlietiet  
lietošanas instrukciju. **Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārs zāles.**  
**Uzģābat bērniem neredzāšanai un asprēšanai vānā. Reģistrācijas apliecības  
izsniegtā:** Bioveta, a.s., Komenského 212/12 683 23 Ivanovice na Hané Čehijas  
Respublika IČ. Nr. VDI19/0074 Parahēti ņgogo veterināro zāļu izplatītāji: SIA  
Vēnneks, Eglaines sāls i. Ozolnēci, Jēlgavās novads, LV-5014;  
Tel.: +371 295999002, www.vvumaz.lv.  
**Pārmarģēšanas sērijas Nr.:**

iena pridedama  
rvetēle!)

aip laikā, nūmīti  
īla jvestī | spenio kanālā,  
ietvirtī. Po gydymō  
slūko link pieno

ms ar bet kuriai šīs

belyje, arba

q valsty  
rgančių