


APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

12.07.2022.



1 ml contient 125 mg de métronidazole. **FR**

Ce produit doit être utilisé avec précaution. Éviter le contact avec la peau et ne pas inhaler. Verser sur une partie de la nourriture et attendre que le chien l'ait complètement consommé ou administrer directement dans la bouche du chien en portant des gants. Lire la notice avant utilisation. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver en-dessous de 30°C. Après ouverture, à utiliser dans les 3 mois. Élimination : lire la notice.

.....ml/.....fois par jour pendant.....jours

Usage vétérinaire.  
À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.  
Respecter les doses prescrites.

FRV/3092401 7/2018

Exploitant: VIRBAC France  
13e rue LID - 06517 Carros - France

CODE BARRES

**Eradia 125 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai suņiem**  
**Metronidazolom 30 ml**

..... ml/ ..... reizes dienā ..... dienas.  
1 ml satur 125 mg metronidazola. Šis zāles var būt kairīgas lietoņajam. Izvairīties no norīšanas un saskares ar ādu. Uzliet daļai barības un nogaidīt, līdz suns to pilnībā apēdis, vai ievadīt tieši dzīvnieka mutē, lietojot cimdus. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Izņīcināšana: skatīt lietošanas instrukciju. Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles. **V/DCP/18/0007** Virbac S.A., 1 ere avenue 2065m LID, 06516 Carros Cedex, Francija

KIZAROLAG ANIATOLVOSI VERIYRE ANIATO M.

VIRBAC  
1ère avenue 2065m LID - 06516 Carros  
France / Franciaország / Prantsusmaa



**Virbac**

**Eradia™**  
**125 mg/ml**

Suspension buvable pour chiens  
Belsőleges szuszpenzió kutyák részére  
Suukaudne suspensioon koertele

Métronidazole /  
Metronidazolom



30 ml

**Virbac**

1 ml sisaldab: **Metronidazolom 125 mg** **EE**

..... ml / ..... korda päevas /  
.....päeva.

Preparaat võib olla ohtlik. Vältida allaneelamist ja kokkupuudet nahaga. Valage osale koera toidust ja oodake, kuni koer on kogu ravimit sisaldava toidu ära söönud, või manustage otse koera suhu, kandes kaitsekindaid. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Pärast pakendi avamist kasutada kuni 3 kuud. Hävitamine: vt pakendi infolehte.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim.

EE 2083

30 ml

Lot:

EXP: