

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

14.04.2020.



ENGEMYCIN

ENGEMYCIN

389176 R2

PSA020G20 01 R1
47x47x99mm
CM:K
1995

ENGEMYCIN

100 mg/ml, sūstelahus veistele, sigadele, hobustele, lammastele, koarteļe ja kasīdele

100 mg/ml injekcinis tīrpalas galvjams, kiaulēms, arklīams, avims, sunīms ir katēms

100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām, zirgiem, aītam, suņiem un kaķiem

Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland/Nyderlandai/
Niderlande

100 ml



ENGEMYCIN

Intramuskulārs, subkutāns, intravenozs kasutāmīss. Enne ravīmī kasutamīst lugege pakendi infolehte.

Keeluaeg:

Vāīkese annusega ravīsseem

Līhale ja sōōdavatele kudedele:

Veīs: 27 pāēva.

Lammas: 18 pāēva.

Sīga: 8 pāēva.

Pīīmale:

Veīs, lammas: 4 pāēva (8 lūpsi).

Suure annusega ravīsseem

Līhale ja sōōdavatele kudedele:

Veīs, lammas: 18 pāēva.

Sīga: 7 pāēva.

Mītte kasutada hobustel, kelle līha tarvītatāse īnīmtoīduks.

Kōōblīkkusaeg pāērast esmāst avāmīst: 28 pāēva.

Hoida temperatūrīl kunī 25 °C. Hoida

origīnālpakendīs, valguse eest kaīstulst.

Hāvītamīne: vt pakendi infolehte.

Aīnult veterīnārsēks kasutamīss. Retseptīravīm.

Hoida laste eest varjātud ja kāētesamātus kohās.

Švīrkāt ī raumenīs, po oda, ī venā. Prieš naudojant

būīna perskāīyti īnīfōmācīnī lapelī.

Īslauka:

skyrus nedīdeles dozes:

skerdīenci īr subproduktams:

galvījū – 27 paros,

avījū – 18 parū,

avījū – 18 parū,

avījū – 18 parū,

avījū – 18 parū,

avījū – 18 parū,

avījū – 18 parū,

avījū – 18 parū,

avījū – 18 parū.

ENGEMYCIN

ENGEMYCIN

1 ml sīsdab.

100 mg oksītetratsūklīnī
(vesīnīklorīdīna).

1 ml yra:

oksītetracīklīno (hīdrohlorīdo)

100 mg.

1 ml satur:

oksītetracīklīns (hīdrohlorīda veīdā)

100 mg.

EE 1380

LT/2/95/0263/001

V/NRP/93/0029

100 ml



Negalīma naudoti arklīmī, kurīe skīrtī žīmōnī maīstulī.

Tīnkamūo laīkas, atīdarīus pīrīmē

pakuote, – 28 d. Negalīma laīkyti aukštēsneje

kaīp 25 °C temperatūrōje. Laīkyti origīnālīoje

pakuoteje, kad vaīstas būjū apsāugotas nuo

švīesos. Naīkīnīmas: skāītyti īnīfōmācīnī lapelī.

Tīk veterīnārīnīam naudojīmū.

Pardūodama tīk su veterīnārīnīu receptu.

Saugoti nuo vaīkū.

Intramuskulārī, subkutānī vai īntravenozāī

līetošanāī. Pīrīs līetošanas īzlasīet īepakojumam

pievīenoto līetošanas īnstrūkcījū.

Īerobejōjūmū perīods:

Arstējot ar zemām devām

Galāī un blakusproduktīm:

Liellopi: 27 dīenas,

Aītas: 18 dīenas,

Cūkas: 8 dīenas.

Pīenam: liellopi, aītas: 4 dīenas (8 slaukšanas

reīzes).

Arstējot ar augstām devām

Galāī un blakusproduktīm:

Liellopi, aītas: 18 dīenas,

Cūkas: 7 dīenas.

Nelīetot zirgīm, no kurīm īegūto produkcījū

paredzēts īzmantot cīlvēkū uzturā.

Derīguma termīnš pēc pīrīmās tīesā īepakojuma

atvēršanas: 28 dīenas. Uzglabāt temperatūrā

līdz 25 °C. Uzglabāt flakonū ārējā īepakojumā,

lāī pasargātu no gāīsmās. Atkrītumū īznīcīnāšana:

īzlasīet līetošanas īnstrūkcījū.

Līetošanāī dzīvīnīekīm. Receptū veterīnārās

zālēs.

Uzglabāt bērīmē neredzamā un nepīeejamā

veīdā.

Lot / EXP

Lackfrei

