



250 ml

Engemycin

Engemycin

368457 R1

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

14.03.2022.

Intramuskulārs, subkutāns, intravenozs
kasutāmīseks.

Enne ravīmi kasutamīseks lugege pakendi infolehte.

Keeluaeg:

Vāīkese annusega ravīseem

Līhale ja sōōdavatele kudelele:

Veīse: 27 pāēva.

Lammas: 18 pāēva.

Sīga: 8 pāēva.

Pīimale:

Veīse, lammas: 4 pāēva (8 lūpsi).

Suure annusega ravīseem

Līhale ja sōōdavatele kudelele:

Veīse, lammas: 18 pāēva.

Sīga: 7 pāēva.

Mītte kasutada hobustel, kelle līha tarītatākse īnīmtoīduks.

Kōōblīkkusaeg pāērast esmāst avāmīst: 28 pāēva.

Hoida temperatūurīl kuni 25°C.

Hoida orīgīnālpakendīse, valguse eest kaitstult.

Hāvītamīne: vt pakendi infolehte.

Aīnult veterīnāarseks kasutamīseks. Retseptīravīm.

Hoida laste eest varījatud ja kātīseamātus kohas.

Švīrkšīī j raumenīse, po oda, j venq.

Pīeš naudojānt būīnā perskāītyī īnīformācīnī lapelī.

Īslauka:

skyrus nedīdeles dozes:

skerdienāī īr subproduktāms:

galvījū – 27 paros,

avījū – 18 parū,

kīaulījū – 8 paros;

pienuī: karvījū īr avījū – 4 paros (8 melzīmai);

skyrus dīdeles dozes:

skerdienāī īr subproduktāms:

galvījū, avījū – 18 parū,

kīaulījū – 7 paros.

Engemycin

100 mg/ml, sūstelāhus veīstele,
sīgadele, hobuste, lammasete,
koertele ja kassīdele

100 mg/ml, īnīekcīnīse tīrpalas
galvījāms, kīaulēms, arklīams,
avīms, šunīms īr katēms

100 mg/ml šķīdums īnīekcījām
līellopīem, cūkām, zīrgīem, aītām,
sunīem un kākīem

Intervet International B.V.
Wim de Korverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland/Nyderlandāī/Nīderlande

250 ml



Engemycin

Negalīma naudoti arklīams, kurie skīrtī žmoniū
maīstui.

Tīnkāmumo laīkas, atīdārius pīrīmīnq pakuoē, – 28 d.

Negalīma laīkytī aukštesnēje kaīp 25 °C

temperatūroje.

Laīkytī orīgīnāloje pakuoēje, kad vaīstas būtū

apsaugotas nuo švīesos.

Naīkīnīmas: skāītytī īnīformācīnī lapelī.

Tīk veterīnārīnīam naudojīmui.

Parduodāma tīk su veterīnārīnīu receptu.

Saugotī nuo vaīkū.

Intramuskulārāī, subkutānāī vai īnītravenozāī
līetošanāī.

Pīrīms līetošanas īzlasīet īepakojāmā pievīenoto

līetošanas īnīstrukcījū.

īerobežojumu periods:

Ārstējot ar zemām devām:

Galājū īnī blakusproduktīem:

Līellopī: 27 dīenas,

Aītās: 18 dīenas,

Cūkas: 8 dīenas.

Pīenam: līellopī, aītās: 4 dīenas (8 slaukšanas reīzes).

Ārstējot ar augstām devām:

Galājū īnī blakusproduktīem:

Līellopī, aītās: 18 dīenas,

Cūkas: 7 dīenas.

Nelīetot zīrgīem, no kuriem īegūto produkcījū
paredzēts īzmāntot cīlvēkū ūzturā.

Derīguma termīnš pēc pīrīmās tīešā īepakojuma
atvēršanas: 28 dīenas.

Ūzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Ūzglabāt flakonu ārējā īepakojumā, laī pasargātū
no gaīsmas.

Atkrītumu īzīnīcīnāšāna: īzlasīet līetošanas īnīstrukcījū.

Līetošanāī dzīvīnīekīem. Receptū veterīnārās zāles.

Ūzglabāt bērīnīem neredzamā un nepīeejamā vietā.

Engemycin

Engemycin

1 ml sīsalda. 100 mg oksītetratsūklīnī
(vesīnīklorīdīnā).

1 ml yra: oksītetracīklīno (hīdrochlorīdo)
100 mg.

1 ml satur: Oksītetracīklīns (hīdrohlorīda
veīdā) 100 mg.

EE 1380
LT/2/95/0263/002
V/NRP/93/0029

250 ml



Imprint area/Varnish free

PSA020113 05 R1
65x65x138mm
CMYK

Lot
EXP

Imprint area/Varnish free

Font Type : Futura Book
Font Size : 9 pt

Font Type : Futura Book
Font Size : 9 pt