

100 ml (50 annust/dozių/devas)

Porcilis Ery+Parvo+Lepto

sūstesuspensioon sigadele
injekcinē suspensija kiaulēms
suspensija injekcijām cūkām

Intervet International B.V.
5831 AN Boxmeer
Holland/Nyderlandai/Niderande
EE 1989
LT/2/16/2367/005
V/DCP/16/0031



Inaktiveeritud *Erysipelothrix rhusiopathiae*, sigade parvovīrus ja *Leptospira*.
Intramuskulaarne.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Keeluaeg: 0 päeva.
Pärast korgi lābistamist kasutada 10 tunni jooksul.

Hoida külmkapis.
Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult.
Hāvitamine: vt pakendi infolehte.
Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
Retseptiravim.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Inaktyvinti *Erysipelothrix rhusiopathiae*, kiaulių parvovirusas ir *Leptospira*.
Švirkšti į raumenis.
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.
Išlauka: 0 parų.
Pradūrus kamštelį, sunaudoti per 10 val.
Laikyti šaldytuve.

Negalima sušaldyti.
Saugoti nuo šviesos.
Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.
Tik veterinarijam naudojimui. Parduodama tik veterinarijos gydytojui.
Saugoti nuo vaikų.

Inaktivēti *Erysipelothrix rhusiopathiae*, cūku parvovīruss un *Leptospira*.
Intramuskulārai injekcijai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Ierobežojumu periods: nulle dienas.
Pēc atvēršanas izlietot 10 stundu laikā.
Uzglabāt ledusskapī.
Nesasaldēt.
Sargāt no gaismas.
Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.
Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Imprint
Area

Lot EXP

372948 R1