

12950105HL

koos 20 puhastuslapiga  
ar 20 salvetem tirtsanai  
ir 20 valomosisos siuostes

*Benzylpenicillinum procainum monohydricum*

**intramammaarsuspensioon lakteerivatele lehmadele  
suspensija ievadišanai tesmenī laktējošām govīm  
intramaminē suspensija karvēms laktācijas metu**

**600 mg**

**Caremast vet**



**APSTIPRINĀTS**

Pārtikas un veterinārajā dienestā

03.02.2022.



**Caremast vet**  
**600 mg**

**intramammaarsuspensioon lakteerivatele lehmadele  
suspensija ievadišanai tesmenī laktējošām govīm  
intramaminē suspensija karvēms laktācijas metu**

*Benzylpenicillinum procainum monohydricum*

**EE** Üks 10 g udarasūstal sisaldab:  
600 mg prokaiinbensülpenitsilliinmonohüdraati  
(vastab 340,8 mg bensülpenitsilliiniga).

**LV** Katrs 10 g injektors satur:  
Benzilpenicilīna prokaīna monohidrāts 600 mg  
(atbilst 340,8 mg benzilpenicilīna).

**LT** Vienamē 10 g intramaminiamē švirkštē yra:  
benzilpenicilīno prokaīno monohidrāto 600 mg  
(atitinka 340,8 mg benzilpenicilīno).

koos 20 puhastuslapiga  
ar 20 salvetem tirtsanai  
ir 20 valomosisos siuostes

20 x 10 g

**LV** Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.  
Mērka sugas: Liellopi (laktējošas govīs). Lietošanai tesmenī. Penicilīni un cefalosporīni dažkārt var izraisīt smagas  
alerģiskas reakcijas. Par piesardzības pasākumiem lietotājam izlasiet lietošanas instrukcijā.

Ierobežojumu periods: Pienam: 6 dienas. Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Atkritumu iznīcināšana:  
izlasiet lietošanas instrukciju.

**LT** Tik veterināriņiam naudojimui. Parduodama tik su veterināriņiu receptu. Prieš naudojimą būtina perskaityti  
informacinį lapelį. Švirkšti j tešmeni. Penicilinai ir cefalosporinai kartais gali sukelti sunkias alergines reakcijas.  
Išsamūs nurodymai naudotojui pateikiami informaciniame lapelyje.

Išlauka: pienui – 6 paros, skerdienai ir subproduktams – 3 paros.

Saugoti nuo vaikų. Laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje. Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.



**Caremast vet**  
**600 mg**

**intramammaarsuspensioon lakteerivatele lehmadele  
suspensija ievadišanai tesmenī laktējošām govīm  
intramaminē suspensija karvēms laktācijas metu**

*Benzylpenicillinum procainum monohydricum*

**EE** Üks 10 g udarasūstal sisaldab:  
600 mg prokaiinbensülpenitsilliinmonohüdraati  
(vastab 340,8 mg bensülpenitsilliiniga).

**LV** Katrs 10 g injektors satur:  
Benzilpenicilīna prokaīna monohidrāts 600 mg  
(atbilst 340,8 mg benzilpenicilīna).

**LT** Vienamē 10 g intramaminiamē švirkštē yra:  
benzilpenicilīno prokaīno monohidrāto 600 mg  
(atitinka 340,8 mg benzilpenicilīno).

koos 20 puhastuslapiga  
ar 20 salvetem tirtsanai  
ir 20 valomosisos siuostes

20 x 10 g

**EE** Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.  
Loomaligid: Veis (lakteerivad lehmad). Intramammaarne. Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad mõnikord  
põhjustada tõsiseid allergilisi reaktsioone. Kõiki hoiatusi ravimi kasutajale vaadake pakendi infolehest.

Keeluaeg: Piimale: 6 päeva. Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hävitamine: vt pakendi  
infolehte.

Vetcare Oy, P.O. Box 99, 24101 Salo, Soome / Somija / Suomija  
EE 1956 / V/DCP/16/0004 / LT/2/16/2334/003

Lot  
EXP