

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

17.06.2024.



Tik veterināriņiam naudojimai./
Lietošanai dzīvniekiem.



KATĒS/
KAKI

2 tabletēs/ tabletes

Dehinel[®] 230 mg/20 mg

plēvele dengtos tabletēs
apvalkotās tabletes

Lot
Exp.



611759

Dehinel[®] 230 mg/20 mg

plēvele dengtos tabletēs
apvalkotās tabletes



251197698888 3

(57,5 mg pirantela embonāta) uz kg ķermeņa svāra.
Dāļiņas tabletes derīguma termiņš pēc pirmreizējas tiešā
lepakojuuma āķvēŗšānas: 1 mēnesis.
Uzglābāt neizmāntotās sadāļiņo tablešu dāļiņas temperatūrā
līdz 25 °C. Katru reizi, kad neizmāntotā sadāļiņā tabletes dāļi
tiek uzglābāta līdz nākamājai lietošanas reizei, tā jāievieto
atvērtajā blisterā nodāļiņumā un jāuzglābā drošā bērniem
neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglābāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
V/DCP/17/0010

Gydyti, esant mišņoms apvalkiųj kirminų,
nematodų ir kaspinuočių infekcijoms.
Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.
Vaistą reikia sušerti.
1 tabletė 4 kg kūno svorio.

Dozavimas
5 mg prazikvantelio ir 20 mg pirantelio
(atitinka 57,5 mg pirantelio embonato)
vienam kg kūno svorio. Tinkamumo laikas,
atidarius pirmine pakuote ir tablete
padalijus per pusę, – 1 mėn. Nesunaudotas
padalytos tabletės pusės laikyti žemesnėje
kaip 25 °C temperatūroje. Kai nepanaudota
tabletes dalis laikoma iki kito naudojimo, ją
būtina įdėti į atida ryą lizdinę plokštelę ir
saugoti nuo vaikų.
Saugoti nuo vaikų.
LT/217/2385/001

Veļķiņāŗpu, āķķāŗpu un lēnleņu izŗāŗsiņu
jāuktu invāŗziņu āŗŗēŗšānai. Pirms lietošanas
izāŗŗiet lietošanas instrukciju, lēķŗķģģāļi
lietošanai.

1 tablete uz 4 kg ķermeņa svāra.

Devās:
5 mg prazikvantela un 20 mg pirantela

Dehinel[®] 230 mg/20 mg



Ķermeņa svārs/ Kāŗmeņa svārs	Tableŗģģ ķieķķis/ Tabletes
6,1 – 8,0 kg	2
8,1 – 10,0 kg	1½
10,1 – 14,0 kg	1
14,1 – 20,0 kg	¾

Kieķķvienoje plēvele dengtoje tableteje yŗāŗ/
Katra apvalkotā tablete satur:

pirantelio embonato/ Pirantela embonāŗš 230 mg
(atitinka 80 mg pirantelio/ atbiŗst 80 mg pirantela),
prazikvantelio/ Prazikvantels 20 mg.