

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

14.05.2024.

Carprodolor®
50 mg/ml
Sūstelahus /
Šķīdums injekcijām /
Injekcinis tirpalas
Veis / Liellopi / Galvijai

LV: 1 ml satur 50 mg karprofēna.

Subkutānai vai intravenozai lietošanai.

Aizbāzni nedrīkst caurdurt vairāk kā 20 reizes.

Ierobežojumu periods:

Gājai un blakusproduktiem: 21 diena.

Pienam: nulle stundas.

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot
28 dienu laikā.

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot līdz

___/___/___

Neatdzesēt vai nesasaldēt.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai
pasargātu no gaismas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai dzīvniekiem.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā
vietā.



5 701170 434774 >

LT: 1 ml yra 50 mg karprofeno.

Leisti po oda, leisti į veną.

Kamštelį pradurti galima ne daugiau
kaip 20 kartų.

Išlauka:

skerdienai ir subproduktams – 21 para.

Pienui – 0 val.

Pradūrus kamštelį, sunaudoti per 28 d.

Pradūrus kamštelį, sunaudoti iki

___/___/___

Negalima šaldyti ar sušaldyti.

Flakoną laikyti kartoninėje dėžutėje, kad
vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos.

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės
lapelį.

Tik veterinariniam naudojimui.

Saugoti nuo vaikų.

Le Vet. Beheer B.V.
EE: Müügiloo nr: 1767
LV: V/DCP/13/0011
LT: LT/2/13/2159/001

Carprodolor®
50 mg/ml
Sūstelahus /
Šķīdums injekcijām /
Injekcinis tirpalas
Veis / Liellopi / Galvijai



50 ml

GTIN: 05701170434774

EE: Üks ml sisaldab 50 mg karprofeeni.

Subkutaanne või intravenoosne.

Viaali korki ei tohi läbistada rohkem kui
20 korda.

Keeluaeg:

Lihale ja söödavatele kudedele: 21 päeva.

Piimale: 0 tundi.

Pärast korgi läbistamist kasutada

28 päeva jooksul.

Pärast korgi läbistamist kasutada kuni

___/___/___

Mitte hoida külmkapis ega lasta külmuda.

Hoida viaal välispakendis, valguse eest
kaitstult.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi
infolehte.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus
kohas.