

MARKĒJUMS
V/MRP/04/1517

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Nav paredzēta lietošanas instrukcija, jo visa nepieciešamā informācija norādīta marķējumā

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Pracetam 10% premix for pigs premikss ārstnieciskās barības pagatavošanai cūkām

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 grams premiksa satur:

Aktīvā viela:

Paracetamols..... 100 mg

Palīgvielas:

Kukurūzas lipekļis

3. ZĀĻU FORMA

Premikss ārstnieciskās barības pagatavošanai cūkām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 kg

25 kg

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas(atšķirtas cūkas)

6. INDIKĀCIJA(S)

Drudža simptomātiskai ārtēšanai akūtu elpošanas ceļu infekciju gadījumā, lietojot kopā ar atbilstošu pretinfekcijas terapiju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Dienas devu 30 mg uz 1 kg ķermeņa svara pievienot barībai 5 dienas pēc kārtas.

Devu var pievienot sausajai barībai, kas paredzēta divām ēdienreizēm.

Produktu drīkst pievienot gan granulu, gan cita veida barībai.

Ārstnieciskās barības sagatavošana:

30 mg paracetamola uz ķermeņa svara atbilst 300 mg "Pracetam 10% Premix" uz ķermeņa svaru katru dienu.

Sagatavojot ārstniecisko barību, jāņem vērā ārstējamo dzīvnieku ķermeņa svars un faktisko ikdienas barības patēriņu. Lai nodrošinātu vajadzīgo aktīvās vielas daudzumu uz kilogramu ārstnieciskās barības, premikss jāpievieno barībai saskaņā ar sekojošo formulu:

$$\frac{300 \text{ mg "Pracetam 10\%"}}{\text{uz kg ķermeņa svara katru dienu}} \times \frac{\text{ārstējamā dzīvnieka}}{\text{vidējais ķermeņa svars (kg)}} = \frac{\text{mg "Pracetam 10\%"}}{\text{uz kilogramu barības}} \\ \frac{\text{vidējais ikdienas barības patēriņš uz dzīvnieku (kg)}}{\text{uz kilogramu barības}}$$

Ieteicams veikt samaisīšanu (atļautā) dzīvnieku barības ražotnē ar atbilstošu maisīšanas iekārtu.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods; gaļai un blakusproduktiem: 1 diena

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Īpaša piesardzība lietošanā dzīvniekiem

Produkts ir premikss, kuru drīkst izbarot cūkām, tikai sajaucot ar cieto barību minimālajā attiecībā 5 kg premiksa uz 1 tonnu barības.

Īpaši piesardzības pasākumi personai, kas dod zāles dzīvniekam

Personām ar zināmu paaugstinātu jutību pret paracetamolu, jāizvairās no saskares ar ārstniecisko barību. Izvairīties no kontakta ar ādu, gļotādām un/vai acīm. Darbojoties ar ārstniecisko barību, uzvilkt cimdus, CE atzītu pretputekļu masku un aizsargbrilles. Kontakta gadījumā ar acīm un/vai ādu, rūpīgi izskalot ar tīru ūdeni. Griezties pēc medicīniskās palīdzības, ja rodas ādas iekaisums vai nepārejoša acu kairinājuma gadījumā.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Veterināro zāļu derīguma laiks izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.
Derīgums pēc pievienošanas barībai: 5 mēneši.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt sausā vietā.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM" UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI "UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ"

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības turētājs un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

SOGEVAL Laboratories
200 Route de Mayenne – BP 2227
53022 LAVAL CEDEX 9
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/MRP/04/1517

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS