

APSTIPRINĀTS  
Pārtikas un veterinārajā dienestā  
27.06.2022.

**Cefabactin® vet 500 mg**  
Tabletid koertele /  
Tabletes šunims /  
Tabletes suņiem

**500 mg**  
**Cefabactin® vet 500 mg**  
Tabletid koertele / Tabletes šunims /  
Tabletes suņiem  
Cefalexin

**100 tabletti / tablečiņi / tabletes**

La Vet, Beheer B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater  
Holland/Nyderlandai/Niederlande

EE: Müügiloa nr: 1978  
LT: LT/2/16/2355/010  
LV: V/DCCP/16/0017

Lot/Serija:  
EXP/Tinka.kj:

GTIN: 05701170434873

5 701170 434873 >

Uks tableti sisaldab: 500 mg tsefaloksīmi  
Kievinole tabletle yra: 500 mg tsefaloksīno  
Katra tablete satur: 500 mg tsefaloksīna

EE: Suukaudne. Erine ravimi kasutamist lugege pakendi infoleht. Pehsilinnid ja teaduspõhised võivad mõnikord põhjustada rasked allergilisi reaktsioone. Pehhilikke kasutusjuhataisi lugege pakendi infolehest. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Otsadeks jagatud tablettide kobilikkusaeeg: 4 päeva. Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Pehsepravitim.

LT: Sušerti. Pries naudotim bñna perskatiñi informacini lapeli. Pehsilinnid ir cefalosporini kaitis gali sukelti sunkias alergines reakcijas. Visus ispeñimus naudotoñui gailma rasti informacimame lapelyje. Padalyñy tableciñy tinkamumo laikas - 4 dienas. Negañilma laikyti akutesnaje kaip 25 °C temperatūroje. Nėkinnimas: skatinyti informacini lapeli.

LV: Iekšējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumā pievienoto lietošanas instrukciju. Iepakojumā pievienoto lietošanas instrukcijā. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Fenicilini un cefalosporini ražem var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. Pirms lietošanas izlasiet dzīvniekiem. Receptu veterinārais zāles.

Datļu tablešu derīguma termiņš: 4 dienas. Neuzglabāt temperatūrā virs 25 °C. Lietošana