

Manustamivisija - tee (S) Sūkandne: Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Hoiatus kasutajale lugege pakendi infolehte. Osadeks jagatud tabletidde võib võtta kolm korda päeva. Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hätivõtmine: vt pakendi infolehte. Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Receptiravim. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Naudojimo būdas (-ai) ir metopas Susērt. Pirms naudojant būdina perskaityti informaciją lapelį. Jspėjimas naudotojui: metronidazolas gali sukelti sunkias nepalankias reakcijas. **PAIKIJA MŪVETI NELAIDŽIAS** PIRSTINES. Visus įspėjimus naudotojui galima rasti informaciniame lapelyje. Padėtyti tablečių tinkamumo laikas – 3 dienas. Negalima laikyti aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Naikimas: skatydū informaciją lapelį. Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu. Saugoti nuo vaikų.

Lietošanas metode un ievaišanas veids (-i) Iekšējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumā pievienoto lietošanas instrukciju. Būrdinājums lietojājam: metronidazols var izraisīt smagas blakspārādības. **JĀLIETO NECAURĻAIDĪCI CIMDI.** Visus brīdinājumus lietojājam skatīt iepakojumā pievienotajā lietošanas instrukcijā. Sadalītu tablešu derīguma termiņš: 3 dienas. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Akūtumun bērniem neredzama un nepieņemama viela.

LV

LT

EE

Loy/Partii nr:
EXP/Kolbilik kuni:

EE Üks tablett sisaldab: Spiramitsiini 750 000 RÜ / Metronidazooli 125 mg

LT Vienoje tableteėje yra: spiramicino 750 000 TV, / metronidazolo 125 mg.

LV Viena tablete satur: Spiramitsina 750 000 IU / Metronidazola 125 mg



SPIZOBACTIN® vet

750 000 RÜ/TV/IU 125 mg



nārimistabletid koortele / kramtomosios tabletės šunims /
košļājamās tabletes suņiem

Spiramycinum / Metronidazolium

10 tabletti / tablečių / tabletes



SPIZOBACTIN® vet
750 000 RÜ/TV/IU
125 mg



Le Vet. Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Holland/NYDERLANDA/Niderlande

APSTIPRINĀTS
Pārtikas un veterinārajā dienestā
24.10.2019.

MūģiĶoĶa nr: 2045
LT/2/17/2410/001
V/DCP/17/0037