

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

19.08.2021.

PROCIPEN

EXP:

Lot:

Bimeda

LV

Katrs ml satur:
Aktīvā viela:
benzilpenicilīna prokaīna sāls 300 mg
(atbilst 175,8 mg benzilpenicilīna)
Palīgvielas: metilparahidroksibenzoāts E218 2,0 mg
Tikai intramuskulārai lietošanai.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Liellopiem:
Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas. Pienam: 108 stundas (4,5 dienas).
Cūkām: Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas. Aitām: Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.
Nav reģistrēts lietošanai aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.
Reizēm penicilīni un cefalosporīni var izraisīt nopietnas alerģiskas reakcijas. Skatīt informāciju lietošanas instrukcijā, sadaļā "Ipaši piesardzības pasākumi lietošanā".
Derīguma termiņš pēc pirmreizējas flakona caurduršanas: 28 dienas. Pēc pirmreizējas caurduršanas, izlietot līdz:
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).
Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.
Lietošanai dzīvniekiem.
Recepšu veterinārās zāles.
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
V/DCP/21/0035

LT

Kiekvienam ml yra:
veikliosios medžiagos:
benzilpenicilino prokaino 300 mg,
(atitinka 175,8 mg benzilpenicilino);
pagalbinės medžiagos: metilo parahidroksibenzoato E218 2,0 mg.
Svirkšti tik į raumenis.
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.
Išlauka:
Galvijai: Skerdienai ir subproduktams - 10 parų.
Pienui - 108 val. (4,5 paros).
Kiaulės: Skerdienai ir subproduktams - 7 paros.
Avys: Skerdienai ir subproduktams - 4 paros.
Neregistruotas naudoti avims, kurių pienas skirtas žmonių maistui.
Penicilinai ir cefalosporinai kartais gali sukelti sunkias alergines reakcijas. Naudojimo įspėjimus žr. informaciniame lapelyje.
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius flakoną: 28 paros. Atidarius sunaudoti iki:
Laikyti šaldytuve (2°C – 8°C).
Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.
Tik veterinariniam naudojimui. Parduoama tik su veterinariu receptu.
Saugoti nuo vaikų.
LT/2/21/2658/001
Bimeda Animal Health Limited
2, 3 & 4 Airton Close, Airton Road
Tallaght, Dublin 24
Iirimaa/ Irja/ Airija
8PRO228

PROCIPEN

300 mg/ml süstesuspensioon veistele, lammastele ja sigadele / suspensija injekcijām liellopiem, aitām un cūkām / injekcinē suspensija galvijams, avims ir kaulēms

Prokainbensüülpenitsilliin
Benzylpenicillīn procaīne
Benzilpenicilīno prokaīnas



100 ml

EE

Üks ml sisaldab:
Toimeaine:
Prokainbensüülpenitsilliin 300 mg
(vastab 175,8 mg bensüülpenitsilliinile)
Abiaine: metüülparahüdroksübensoaat E218 2,0 mg
Ainult intramuskulaarseks kasutamiseks.
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.
Keeluaeg:
Veised: Lihale ja söödavatele kudedele: 10 päeva.
Piimale: 108 tundi (4,5 päeva).
Sead: Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva.
Lambad: Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.
Ei ole lubatud kasutamiseks lammastel, kelle piima tarvitatakse inimestideks.
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad mõnikord põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone.
Lugege hoiatusi pakendi infolehtelt.
Kõlblikusaeg pärast esmast avamist: 28 päeva.
Pärast avamist kasutada kuni:
Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).
Hävitamine: vt pakendi infolehte.
Ainult veterinaarseks kasutamiseks.
Retseptiravim.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Müügiloa nr: 2291



5 391510 237228