

31. 03. 2010

MARKĒJUMS
V/MRP/07/1684

INFORMĀCIJAI, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

50 ml, 200 ml, 500 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ecomectin

10 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām

Ivermectin

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 ml satur:

Aktīvā viela: ivermektīns 10 mg

Citas palīgvielas: benzola spirts 10 mg

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml, 200 ml, 500 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas un cūkas

6. INDIKĀCIJA(S)

Liellopiem:

Gastrointestinālo apaļo tārpu, plaušu tārpu, acu tārpu, spindeļu, kašķa ērcu un utu (kā norādīts zemāk) izraisīto slimību ārstēšanai gaļas šķirņu un nelaktējošu slaucamo šķirņu liellopiem.

Aitām:

Gastrointestinālo apaļo tārpu, plaušu tārpu, psoroptozes kašķa (aitu kašķa) un deguna dunduru invāzijas ārstēšanai.

Cūkām:

Gastrointestinālo apaļo tārpu, plaušu tārpu, utu un kašķa ērcu izraisīto slimību ārstēšanai cūkām.

Ieteicamās devas līmenis: 200 mikrogrami ivermektīna uz kg ķermeņa svara liellopiem un aitām, un 300 mikrogrami ivermektīna uz kg ķermeņa svara cūkām

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Ārstēšana:

Injicēt zemādā sekojošās devās

Liellopi 1,0 ml uz 50 kg

Aitas 0,5 ml uz 25 kg

Cūkas 1,5 ml uz 50 kg

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

8. IZDALĪŠANĀS PERIODS NO ORGANISMA

Liellopi:

Gaļai un blakusproduktiem: 49 dienas.

Aitas:

Gaļai un blakusproduktiem: 42 dienas.

Cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: 28 dienas

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUM(I), JA NEPIECIEŠAMS

Lietot tikai injekcijām zemādā.

Nedrīkst lietot laktējošām piena govīm un aitām, kuru pienu izmanto cilvēku uzturā. Nedrīkst lietot nelaktējošām slaucamo šķirņu govīm, tai skaitā grūsnām telēm, vai nelaktējošām piena aitām 60 dienas pēc atnešanās.

Avermektinu var labi nepanest visas sugas, kuras neietilpst mērķa sugās. Zāļu nepanešanas gadījumi ar fatālu rezultātu ir novēroti suņiem – īpaši kollījiem, angļu aitu suņiem un līdzīgām šķirnēm un krustojumiem, kā arī bruņurupučiem.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: mēnesis/gads

Pēc iepakojuma atvēršanas un pirmās devas izmantošanas produktu izlietojiet 28 dienas laikā

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Uzglabāt ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

ĪPAŠI BĪSTAMS ZIVĪM UN ŪDENS VIDEI. Nepiesārņojiet ar šīm zālēm vai izlietoto iepakojumu virszemes ūdeņus vai novadgrāvjus. Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

13. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM“ UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI „UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ“.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

ECO Animal Health Ltd.
78 Coombe Road
New Malden
Surrey KT3 4QS
APVIENOTĀ KARALISTE

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/07/1684

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

<Sērija> <Sēr.> <sērijas numurs> {numurs}