


APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

10.12.2021.

V.M.D. n.v. • Hoge Mauw 900 • 2370 Arendonk • België/België/Belgien
Z900122.00



Zulassungsnummer DE: 402538.00.00

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.
Nach Rekonstruktion innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 6 Monaten verbrauchen.
Nach dem ersten Öffnen den Behälter fest verschlossen halten.

Aufbewahren:
Wartezzeit(en): Essbare Gewebe: 21 Tage.
zur Verfügung gestellt.
der Verabreichung des medikamentösen Trinkwassers wird wieder normales Trinkwasser zur Verfügung gestellt.
zur einmaligen Anwendung in einer begrenzten Menge Trinkwasser bestimmt. Nach
Die empfohlene Dosis beträgt 10 mg Levamisol pro kg Körpergewicht
entsprechend einer Dosis von 13,3 mg des Tierarzneimittels. Das Tierarzneimittel ist
1 g enthält: 884 mg Levamisolhydrochlorid entsprechend 750 mg Levamisol.

Anwendung:

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Für Tiere:
DE


APSTIPRINĀTS
Pārtikas un veterinārajā dienestā
10.12.2021.

Elimination: lire la notice.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Après reconstitution: 24 heures.
Après ouverture, à utiliser dans les 6 mois.
Après la première ouverture, conserver le récipient soigneusement fermé.

Conservation:

Poeder voor gebruik in drinkwater voor varkens.
Levamisol hydrochloride.
Poudre pour administration dans l'eau de boisson pour porcs.
Chlorhydrate de lévamisole.
Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser für Schweine.
Levamisolhydrochlorid.


BE-V534560



Levaveto 750 mg/g
Poeder voor gebruik in drinkwater voor varkens.
Levamisol hydrochloride.
Poudre pour administration dans l'eau de boisson pour porcs.
Chlorhydrate de lévamisole.
Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser für Schweine.
Levamisolhydrochlorid.

BE-V534560
REG NL 122516

V.M.D. n.v. • Hoge Mauw 900 • 2370 Arendonk • België/België/Belgien
Z900122.00



FR
À usage vétérinaire.
À ne détenir que sur ordonnance vétérinaire.
Lire la notice avant utilisation.

1 g contient: Chlorhydrate de lévamisole 884 mg équivalent à lévamisole 750 mg.

Administration:
La dose recommandée est de 10 mg de lévamisole/kg de poids vif, soit 13,3 mg de poudre par kg de poids vif. Le produit est destiné à une administration unique dans un volume restreint d'eau potable. Après l'administration de l'eau de boisson médicamenteuse, la consommation d'eau normale est reprise.

Temps d'attente: Viande et abats: 21 jours.

V.M.D. n.v. • Hoge Mauw 900 • 2370 Arendonk • België/België/Belgien
Z900122.00

Z900122.00

Levaveto 750 mg/g pulveris lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām
Levamisoli hydrochloridum

1 g satur: Levamizola hidrohlorīds 884 mg, atbilst *levamisolum* 750 mg.
Ieteicamā deva ir 10 mg levamizola bāzes / kg ķ.sv., kas atbilst 13,3 mg zāļu. Šis veterinārās zāles paredzētas vienreizējai lietošanai noteiktā dzeramā ūdens daudzumā. Pēc zāļu saturoša dzeramā ūdens lietošanas atjaunot tīra dzeramā ūdens padevi. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. **Ierobežojumu periods:** gaļai un subproduktiem: 21 diena. Pēc pirmreizējas atvēršanas uzglabāt iepakojumu cieši noslēgtu. Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 6 mēnešu laikā. Pēc izšķīdināšanas: izlietot 24 stundu laikā. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju. Lietošanai dzīvniekiem. Receptšu veterinārās zāles. V/MRP/18/0036 V.M.D. n.v., Hoge Mauw 900, B-2370 Arendonk, Beļģija