



Norbrook

Uztrūkusios karvės
Kinnislehmad
Cietstāvošas govīs



Cefkinomas (cefkinomo sulfātas) / Tsefkvinoom (sulfaadina) / Cefquinome (as Cefquinome sulfate)

150 mg intramammarāsalv kinnislehmadele
150 mg ziede ievadīšanai tesmenī cietstāvošām govīm

150 mg intramaminis tepalas uztrūkusioms karvēms

24 švirkštai po 3 g
24 x 3 g sūstal
24 x 3 g injektors

Tik veterināriņiam naudojimui / Ainult veterināarseks kasutamīseks/
Lietošanai dzīvniekiem

200751C02

APSTIPRINĀTS

Partikas un veterinārajā dienestā

19.02.2020.

Tik veterināriņiam naudojimui / Ainult veterināarseks kasutamīseks/
Lietošanai dzīvniekiem

24 švirkštai po 3 g
24 x 3 g sūstal
24 x 3 g injektors

CEFIMAM® DC

150 mg intramaminis tepalas uztrūkusioms karvēms
150 mg intramammarāsalv kinnislehmadele
150 mg ziede ievadīšanai tesmenī cietstāvošām govīm

Cefkinomas (cefkinomo sulfātas) / Tsefkvinoom (sulfaadina) / Cefquinome (as Cefquinome sulfate)



Uztrūkusios karvės
Kinnislehmad
Cietstāvošas govīs



VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Vienamē 3 g švirkstē yra:
veiklīosios medžiagos:
cefkinomo (cefkinomo sulfato) 150 mg

INDIKACIJA (-OS)

Pieninēms karvēms, uztrūkinimo metu sergančioms subklīniskū mastitū gydītī ir uztrūkinimo laikotarpiū apsāugoti nuo naujū tēsimens bakterijū infekcijū uztrūkinimo metu, kurias sukēlia cefkinomui jautrūs mikroorganizmai:
Streptococcus uberis, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus aureus*, koagulāzēi neigiami stafilokokai.

NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkštī į tēsmenī.
Svirkštī į tēsmenī vienā kartā.
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

IŠLAUKA

Skerdienai ir subproduktams – 2 paros.
Pienui – 1 para po apsvēršiavimo, jeigu uztrūkinimo laikotarpis truko ilgiau nei 5 sav., 36 paros po gydymo, jei uztrūkinimo laikotarpis truko 5 sav. ar trumpiau.

SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.
Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

Tik veterināriņiam naudojimui. Parduodama tik su veterināriņiu receptu.

Saugoti nuo vaikū.

REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited,
Rossmore Industrial Estate,
Monaghan, Airija.

LT/2/14/2253/002

TOIMEAINĖ(TĖ) JA ABIAINĖTĖS SISALDUS

Iga 3 g eeltāidētud sūstalī sisaldab:

Toimeaine:
Tsefkvinoom (tsefkvinoomsulfaadina) 150 mg

NĀIDUSTUS(ĒD)

Subklīniskē mastitidī raviks kinnjātīmēlī ja kinnisperioodī piimalehmadēl uute bakteriālsetē udaranakūstē vāltīmēseks, midā pāhjustavād jārgmīsēd tsefkvinoomilē tundlikud mikroorganizmid: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus aureus*, koagulāsnegatīvsēd stafilokokid.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intramammaarne.
Ūhekorndē intramammaarne manustamine.
Enne ravimī kasutamist lugege pakendi infolēhte.

KEELUĀEG

Lihale ja sōdāvatēle kudēdele: 2 pāeva.
Pīmalē: 1 pāev pārast poegimist, kui kinnisperiood on pikem kui 5 nādālat.
36 pāeva pārast ravi, kui kinnisperiood on 5 nādālat vōi lūhem.

ERHOIATUS(ĒD), KUI VAJALIK

Enne ravimī kasutamist lugege pakendi infolēhte.

ERINŪDEDE ETTEVAATUSABINŪDE OSAS KASUTAMATA JĀĀNUD PREPARĀADI VŪI JĀĀTMETE HĀVITĀMISEL, KUI NĒD ON KEHTĒSTATUD

Hāvītamine: vt pakendi infolēhte.

Ainult veterināarseks kasutamīseks. Retseptīravim.

Hoida laste eest varjatud ja kĀtēsaamatus kohas.
MŪGILOA HOIDJĀ NIMI JA AADRES
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited,
Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Airimaa.

MŪgiiloa nr: 1862

Tik veterināriņiam naudojimui / Ainult veterināarseks kasutamīseks/
Lietošanai dzīvniekiem

24 švirkštai po 3 g
24 x 3 g sūstal
24 x 3 g injektors

CEFIMAM® DC

150 mg intramaminis tepalas uztrūkusioms karvēms
150 mg intramammarāsalv kinnislehmadele
150 mg ziede ievadīšanai tesmenī cietstāvošām govīm

Cefkinomas (cefkinomo sulfātas) / Tsefkvinoom (sulfaadina) / Cefquinome (as Cefquinome sulfate)



Uztrūkusios karvės
Kinnislehmad
Cietstāvošas govīs



AKTĪVO VIĒLU NOSAUKUMS

Katrs 3 g injektors tesmenim satur:
Aktīvā viela:
Cefkinoms: 150 mg
(cefkinoma sulfāta veidā)

INDIKACIJA(-S)

Subklīniskā mastitā ārstēšanai cietlāišanas laikā un jaunū bakterīalū tesmenā infekcijū novēršanai slaucamām govīm cietstāvēšanas periodā, kuras ierosina sekōjoši pret cefkinomū jutīgi mikroorganizmi: *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus agalactiae*, *Staphylococcus aureus*, koagulāzes negatīvie stafilokokai.

LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai tesmenī.
Vienreizējai ievadīšanai tesmenī.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

IEROBEŽŪJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTŪŠANĀ

Gājai un biakusproduktiem: 2 dienas.
Pīnam: 1 diena pēc dzemdībām, ja cietstāves periods ir ilgāks par 5 nedēlām.
36 dienas pēc ārstēšanas, ja cietstāves periods ir 5 nedēļas vai īsāks.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETŪTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATRĪTUMU IZNICĪNĀŠANAI

Atkrītumū iznicināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

Lietošanai dzīvniekiem. Receptū veterināras zāles. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

REGISTRĀCIJAS APLĒCĪBAS IPĀŠNĒKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Airija

REGISTRĀCIJAS APLĒCĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/14/0054

Serija:
Partij nr:
Lot:

Tinka iki:
Kōblīk kuni:
Exp:

VFA