

100 ml šķiduma satur:

Aktīvās vielas:

Kalcija glikonāts 24,0 g
(atbilst Ca^{2+} : 2,15g vai 54 mmol)
Magnija hlorīds, 6 H_2O 6,0 g
(atbilst Mg^{2+} : 0,72g vai 30 mmol)
Borskābe 6,0 g

Šķidrums nesatur endotoksīnus.

Stiprs hipertonisks šķidrums.

Zāļu forma

Šķidrums infūzijām.

Dzīds, bezkrāsains līdz viegli
iedzeltens šķidrums.

Indikācija(-s)

Zirgiem, liellopiem, aītām,
kazām, cūkām:
akūtas hipokalcēmijas
ārstēšanai.

Kā papildlīdzeklis alerģijas,
anafilakses, hemorāģisko
diatēžu gadījumā.

Kontrindikācijas

Nelietot sekojošos gadījumos:

- hiperkalcēmija un
hipermagnēmija,
- idiopātiska hipokalcēmija
kumelēm,
- kalcinoze liellopiem un
mazajiem atgremotājiem,
- septicēmija akūta mastīta
gadījumā liellopiem,
- pēc lielu D3 vitamīna devu
lietošanas,

C-B-Gluconat 24% plus 6%

šķidrums infūzijām zirgiem,
liellopiem, aītām, kazām un
cūkām

Calcium gluconate/
Magnesium chloride/
Boric Acid

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Bela-Pharm GmbH & Co.KG
Lohner Str. 19, 49377 Vechta / Vācija

Vietējais pārstāvis:

SIA „Bebra Serviss”
„Doktorāts”, Bebrene pagasts
Ilūkstes novads
LV-5439, Latvija



bela-pharm GmbH & Co.KG
Lohner Straße 19 · D-49377 Vechta

11/20 E1585154LVL

Sērija:

Derīgs līdz:

APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

12.03.2021.

- hroniska nieru nepietiekamība,
- vienlaikus vai uzreiz pēc
neorganisko šķidrumu
ievadīšanas.

Nelietot gadījumos, ja
konstatēta pastiprināta jutība
pret aktīvajām vielām vai pret
kādu no palīgvielām.


Iespējamās blakusparādības

Kalcijs pat, ja lietots tikai
terapeitiskās devās, var izraisīt
pārejošu hiperkalcēmiju ar
šādiem simptomiem:
- sākotnēja bradikardija,
- nemiers, muskuļu trīce,
siekalošanās,
- paātrināta elpošana.
Novēlotas blakusparādības
var izpausties kā vispārējā
veselības stāvokļa traucējumi,
hiperkalcēmijas simptomi 6 – 10
stundas pēc zāļu lietošanas,
bet tie nav jādiagnosticē kā
atkārtota hipokalcēmija.



4 044565 006813

500 ml



Ja novērojat jebkuras blakusparādības arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par to savu veterinārārstu.

Mērķa sugas

Zirgi, liellopi, aitas, kazas, cūkas.

Devas atkarībā no dzīvnieku sugas, lietošanas veida un metodes

Lēnām intravenozām infūzijām.

• *Liellopi:*

akūtas hipokalcēmijas gadījumos:

40-50 ml C-B-Gluconat 24% plus 6% / 50 kg ķermeņa svara (atbilst 0,43 – 0,54 mmol Ca²⁺ un 0,24 – 0,30 mmol Mg²⁺ / kg ķermeņa svara).

kā papildlīdzeklis alerģiju, anafilakses, hemorāģiskās diatēzes gadījumā:

25-30 ml C-B-Gluconat 24% plus 6% / 50 kg ķermeņa svara (atbilst 0,27 - 0,32 mmol Ca²⁺ un 0,15 - 0,18 mmol Mg²⁺ / ķermeņa svara).

• *Zirgi, teļi, aitas, kazas, cūkas:*

30 ml C-B-Gluconat 24% plus 6% / 50 kg ķermeņa svara (atbilst 0,32 mmol Ca²⁺ un 0,18 mmol Mg²⁺ / ķermeņa svara).

Atkārtoti ievadīt ne ātrāk kā 6 stundas pēc pirmreizējās lietošanas. Ja esošie hipokalcēmijas simptomi neizzūd, var veikt papildus infūzijas ar 24 stundu intervālu.

Ieteikumi pareizai lietošanai

Intravenozā infūzija jāveic lēnām 20 – 30 minūšu laikā. Devu norādes ir dotas kā vadlīnijas un ir jāpiemēro individuālajam kalcija deficītam un esošajam asinsrites sistēmas stāvoklim.

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

Īpaši uzglabāšanas norādījumi

Uzglabāt temperatūrā ne zemākā kā 8 °C. Neatdzesēt vai nesasaldēt. Lietot tikai dzidru šķīdumu, oriģinālā, neatvērtā iepakojumā.

Īpaši brīdinājumi

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Intravenozā infūzija jāveic lēnām.

Infūzijas laikā jākontrolē sirdsdarbība un asinsrite.

Ja parādās pārdozēšanas pazīmes (sirds ritma traucējumi, asinsspiediena samazināšanās, nemiers), infūzija nekavējoties jāpārtrauc.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura

lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Uzmanīties no nejausās (gadījuma rakstura) pašinjicēšanas, jo tas var izraisīt lokālu kairinājumu injekcijas vietā. Ja notikusi nejausa pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības, laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Kalcijs pastiprina sirds glikozīdu iedarbību.

Kalcijs pastiprina β-adrenerģisko vielu un metilksantīnu iedarbību uz sirdi.

Glikokortikosteroīdi kā D vitamīna antagonisti, pastiprina kalcija izdalīšanos caur nierēm.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pārāk strauja ievadīšana vai pārdozēšana var izraisīt hiperkalcēmiju vai hiperamnēmiju ar kardiotoxiskiem simptomiem, tādiem kā sākotnēja bradikardija ar sekojošu tahikardiju, sirds ritma traucējumi, smagos gadījumos

arī ventrikulārā fibrilācija.
Citi hiperkalcēmija simptomi ir muskuļu vājums, muskuļu trīce, pastiprināta uzbudināmība, nemiers, svīšana, poliūrija, pazemināts asinsspiediens, depresija, kā arī koma.

Maksimālā infūzijas līmeņa pārsniegšana histamīna izdalīšanās dēļ, var izraisīt alerģiskas reakcijas.
Šādos gadījumos infūzija nekavējoties jāpārtrauc.

Hiperkalcēmijas simptomi var būt novēroti 6 – 10 stundas pēc zāļu lietošanas un tie nav jādiagnosticē kā atkārtota hipokalcēmija līdzīgu simptomu dēļ.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi tika apstiprināta 11/2020

Cita informācija

Flakona tilpums 500 ml, kas iepakots kartona kastē pa 1, 6 vai 12 flakoniem.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti. **Lietošanai dzīvniekiem.**

Recepšu veterinārās zāles.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas:
izlietot nekavējoties.

Neizlietotais šķīduma daudzums jāiznīcina.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG
Lohner Str. 19
49377 Vechta
Vācija

V/NRP/14/0004