


APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā


29.04.2024.

100 ml

 **Enroxil**<sup>®</sup>



Liellopi (teļi), cūkas,  
aitas, kazas, suņi.



**50 mg/ml šķīdums injekcijām**

enrofloksacīns.....50 mg/ml  
Teļiem subkutānai vai intravenozai  
lietošanai, aītām un kazām subkutānai  
lietošanai, cūkām intramuskulārai  
lietošanai, suņiem subkutānai lietošanai.  
Ierobežojumu periods:  
Teļiem  
i.v. Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas.  
s.c. Gaļai un blakusproduktiem: 12 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru  
pienu izmanto cilvēku uzturā.

Aītām  
Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas.  
Pienam: 3 dienas.

Kazām  
Gaļai un blakusproduktiem: 6 dienas.  
Pienam: 4 dienas.

Cūkām  
Gaļai un blakusproduktiem: 13 dienas.  
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.  
Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot  
28 dienu laikā.  
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.  
Sargāt no gaismas.

 KRKA



608077

Lot  
Exp.