

90205209



Tāpīlahus koortels
ūle 25 kg kuni 40 kg
Šķidums pilināšanai uz ādas
suniem 25-40 kg
Uzlašinamasis tirpalas
>25-40 kg svorio šunims

4 x
4,0 ml

105 x 25 x 195

25 kg -
40 kg



Advantix®



Advantix®

Advantix®



Tāpīlahus koortels
ūle 25 kg kuni 40 kg
Šķidums pilināšanai uz ādas
suniem 25-40 kg
Uzlašinamasis tirpalas
>25-40 kg svorio šunims

Imidaclopridum/Permethrinum



4 x 4,0 ml



4 007222 104977



APSTIPRINĀTS

Pārtikas un veterinārajā dienestā

14.03.2022.

Advantix®



Mitte manustada kassidele.
Nelietot kakjiem!
Negalina naudoti katems.

ES

Ūks 4,0 ml pipetē satur:

400 mg imidacloprīdi ja 2000 mg permethrīni.

4 pipetē (4 x 4,0 ml)

- Kūrbunāksuse raviks ning profilaktikāks; vūb

kasatada kirpudest tingitūd atērligēse derma-

tīdi (FAD) ravistāreģia osana.

- Hāvitāt koerāvāid.

- Koerāvāid ja puugnāksuse raviks. Peleltava ja

sumava toime tūtu vāhēdab koerte vektōri-

te pūot sirutādū haiguste (nt borreliosis, ri-

ketisiozes ja erlihiozes) edāsikandūmēse ohtu.

- Peleltab pīstēsāšēd ja moskītōd, vāhēdādes

leisimānosos edāsikandūmēse ohtu.

- Peleltab pīstēkārībēd, adātes āra hōida

kārībēharmūstēstēst pōhjustatūd dermatitū.

Ainūt vālispidisēks kasūtamēks.

Enne ravimi kasutamist lugeje pakendi

infolēte.

Hōida foollūmpakēd bistērlēga vālispakēdīs.

Mitte kasatada alla 7 nādala varustel vōi alla

25 kg kaalvatel kutsikatel.

Kasatada 24 kuu pōksul pārst foollūmpakēdi

avārist vōi enne EXP tēpū, kui see on lūhem.

Mitte laeta kūlmūda. Pārst foollūmpakēdi

avārist hōida kuivās kohās temperatūrāt

kuni 30 °C.

Hāvitāmine: vt pakēdī infolēte.

Ainūt veterinārsēks kasūtamēks.

Kāsmūlīgēravim. Hōida laste eest varjatūd

ja kātēsāmatūs kohās.

LV

Viena 4,0 ml pipetē satur:

400 mg imidacloprīdi, 2000 mg permethrīni.

4 pipetēs (4 x 4,0 ml)

- Iznicina blūsas (ārstēšana un kontrolē); var

lietot kā daļu no ārstēšanas stratēģijas pret

blūsu alērgisķo dermatitū.

- Iznicina graužējus.

- Atvāra un iznicina ērcēs, samazinot vektōru

pārmēsāto slīmību (piemēram, boreliozes,

riketsiozes un erlihiozes) risku sunim.

Mūiģlōia hōidja/Reģistrācijas aplēcības ipatnēks/Reģistratōjas:

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Saksamaa/Vācija/Vokietija

Tootja/Ražotājs/Gamītōjas:

KVP Pharma + Veterinārprodukte GmbH

Proyendtorfer Str. 324, 24106 Kiel, Saksamaa/Vācija/Vokietija

Lot:

EXP:

(01)0400722104977

- Atvāra odus un smēlūs mušās, samazinot

leisimāniju pārmēsāšanas risku.

- Atvāra sviois mušās, pārdēst novērst mušu

kodumu izraisīto dermatitū.

Tikai ārtīgi lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pie-

vienoto lietošanas instrukciju.

Uzglābāt folijas maiņos ar bīstēriem karbōna

kastē. Nelietot kucēniem līdz 7 nedēlu vecū-

mam vai sunim, kuru ķermēna svārs ir līdz

25 kg. Izlietot 24 mēnešu laikā pēc alumīnija

folijas maiņos atvēršanas vai līdz derīguma ter-

miņa beigām, ja tas ir tāks. Neesāsdēt.

Pēc alumīnija folijas maiņa atvēršanas uzglā-

bāt sausā vietā un temperatūrā līdz 30 °C.

Atkrītumu iznicināšana: izlasiet lietošanas

instrukciju.

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veteri-

nāras zāles. Uzglābāt bērniem nerēdzamā

un nepieejamā vietā.

LT

4,0 ml pipetēje yra:

400 mg imidacloprido, 2000 mg permethrino.

4 pipetes (4 x 4,0 ml)

- Naikina blusas (gydymui ir profilaktikai); gali

būti naudojamas kaip blūsu sukeltū alerginio

dermatito (BAD) gydymo strategijos dalis.

- Naikina plaukagužius.

- Naikina ir atvāda ērcēs; sumāžina užskrēt-

mo leisimānoze rizikā.

- Atvādo uodus ir smēlines mušes; sumāžina

užskrētmo leisimānoze rizikā.

- Atvādo pūkmūses; apsaugo nuo įkandimų

sukeltū dermatitū.

Tik isorniam naudojami.

Prieš naudojant būtina perskaityti infor-

macinį lapelį.

Folijos maišēj au lodnēmīs pūkstēlēmīs lai-

kyti kartonmēje dāžūtē.

Negalina naudoti šunūkamīs iki 7 savaičių

amžiaus ir sverantiems mažiau nei 25 kg. Pa-

žeidus originalū folijos maišēj, būna sunau-

doti per 24 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo

laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis. Nega-

lima sušaldyti. Atidarius folijos maišēj, laikyti

sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 30 °C

temperatūroje.

Naikiminas: skaityti informaciją lapelį.

Tik veterinariam naudojami. Saugoti

nuo vaikų.

Bayer

