



**BOVILIS**  
**Rotavec Corona**  
 süsteemulsioon veistele/  
 Rotavec Corona  
 10 ml  
 5 annust/  
 dozes/devas  
 injektine emulsija galvijams/  
 emulsija injekcijam liellopiem

**APSTIPRINÄTS**  
 Pärtikas un veterinārajā dienestā  
 30.07.2021.

**Bovilis  
 Rotavec Corona**

süsteemulsioon veistele/  
 injektine emulsija galvijams/  
 emulsija injekcijām liellopiem

Ūks 2 ml annus sisaldab: Veiste rotavīrus, UK-Compton<sup>1</sup> tīvi, serotīp G6 P5 (inaktiveeritud) ≥ 874 U<sup>1</sup>. Veiste koronavīrus, Mebus<sup>1</sup> e tīvi (inaktiveeritud) ≥ 3,41 log<sub>10</sub>/ml ELISA antikeha titer<sup>1</sup>, E. coli F5 (K99) adhesiin ≥ 0,64 ELISA antikeha OD väärtus<sup>1</sup>

<sup>1</sup> vt pakendi infolehte

Veis (tiined lehmād ja mullikād).  
 Intramuskulaarne. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Keeluaeg: 0 pāeva. Juhuslik sūstimine isendāle on ohtlik. Enne kasutamist loksutage korralikult. Kōblikkusaeg pārast vahetu pakendi esmast avamist: 28 pāeva. Hoida ja transportida kōlmas. Mitte lasta kōlmuda. Hoida valguse eest kaitsult. Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Retseptiravim. Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kiekvienoje 2 ml dozeje yra: inaktivintų UK-Compton padėrmės G6 P5 serotipo galvijų rotavirusų ≥ 874 V<sup>1</sup>, inaktivintų Mebus padėrmės galvijų koronavirusų ≥ 3,41 log<sub>10</sub>/ml ELISA antikūnų titr<sup>1</sup>, E. coli F5 (K99) adhezini ≥ 0,64 ELISA antikūnų OD vertės<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Žr. informacinį lapelį.

Galvijai (veršingos karvės ir telyčios). Švirkšti į raumenis. Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį. Išlauka: 0 parų. Atsitiktinis švirkštimas yra pavojingas. Prieš naudojimą reikia gerai suplakti. Pradūrus kamštelį, sunaudoti per 28 d. Laikyti ir gabenti šaltai. Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos. Tik veterinarijam naudojimui. Parduodama tik su veterinariu receptu. Saugoti nuo vaikų.

Katra 2 ml deva satur: inaktivėts liellopu rotavīruss, celms UK-Compton, serotips G6 P5 ≥ 874 U<sup>1</sup>, inaktivėts liellopu koronavīruss, celms Mebus ≥ 3,41 log<sub>10</sub>/ml ELISA antivieliu tirts<sup>1</sup>, E. coli F5 (K99) adhezins ≥ 0,64 ELISA antivieliu OD vērtiba<sup>1</sup>.

**BOVILIS**  
**Bovilis  
 Rotavec Corona**  
 süsteemulsioon veistele/  
 injektine emulsija galvijams/  
 emulsija injekcijām liellopiem  
**10 ml**  
 Intramuskulaarne/Svirkšti į raumenis/  
 Intramuskulārai lietošanai  
 5 annust/dozes/devas  
 2 ml annus/doze/deva

<sup>1</sup>Skatīt lietošanas instrukciju. Liellopi (grūsnas govīs un teles). Intramuskulārai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. Ierobežojumu periods: nulle dienas. Nejausa injicēšana ir bīstama. Pirms lietošanas rūpīgi saskalināt. Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot 28 dienu laikā. Uzglabāt un transportēt atdesētu. Nesasaldēt. Sargāt no gaismas. Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošām veterinārārstam. Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Intervet International B.V.  
 Wim de Koverstraat 35  
 5831AN Boxmeer  
 Holland/Nyderlandai/  
 Nīderlande  
 EE 1497  
 LT/2/08/1796/002  
 V/MRP/08/0002



387033 R4  
 PSA020B34 01 R2  
 36x36x67mm  
 C M Y K

Lot EXP

Imprint area  
 Varnish free

