

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/DCP/17/0019
Cestal Cat 80/20 mg košlājamās tabletes kaķiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs :

Ceva Sante Animale
10 avenue de la Ballastiere
33500 Libourne
Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cestal Cat 80/20 mg košlājamās tabletes kaķiem

Praziquantel
Pyrantel embonate

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 tablete satur :

Aktīvās vielas:

Prazikvantels	20 mg
Pirantela	80 mg, atbilst 230 mg pirantela embonāta

Dzeltenīgi brūnas, ovālas tabletēs ar daļījuma līniju.

Katru tabletē var sadalīt divās vienādās daļās.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Kaķiem jauktas lenteņu un apaļtārpu invāzijas ārstēšanai, kuru ierosina šādi parazīti:

- apaļtārpi - *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina* (pieaugušās un vēlīnās kāpuru formas),
- āķtārpi - *Ancylostoma tubaeforme*,
- lenteņi - *Echinococcus multilocularis*, *Hydatigena (Taenia) taeniaeformis*, *Dipylidium caninum* (pieaugušās un kāpuru formas) *Joyeuxiella* spp.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām. Nelietot kaķēniem, kuri ir jaunāki par 6 nedēļām. Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus) var novērot vieglus un pārejošus gremošanas trakta traucējumus, tādus kā pastiprināta siekalošanās un/vai vemšana un vieglus un pārejošus neiroloģiskus traucējumus, tādi kā ataksija.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ieteicamā deva ir 20 mg pirantela (atbilst 57,5 mg/kg pirantela embonātam) un 5 mg prazikvantela /kg. Tas atbilst 1 tabletei uz 4 kg ķermeņa svara.

- Ķermeņa svars vismaz 1 kg līdz maksimums 2 kg: ½ tablete.
- Ķermeņa svars lielāks par 2 kg līdz maksimums 4 kg: 1 tablete.
- Ķermeņa svars lielāks par 4 kg līdz maksimums 6 kg: 1½ tablete.
- Ķermeņa svars lielāks par 6 kg līdz maksimums 8 kg: 2 tabletes.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Vienreizēja deva iekšķīgai lietošanai.

Lietošanas metode un ārstēšanas ilgums

Košlājamā tablete jādod dzīviekiem tieši mutē, vai, ja nepieciešams, saaucot kopā ar barību.

Apalātāru invāzijas gadījumā, īpaši jauniem dzīviekiem, pilnīga to iznīcināšana var nenotikt, tāpēc saglabājas invāzijas risks cilvēkiem.

Pētījumā, kas tika veikts 30 kakiem, 83% kaķu brīvprātīgi apēda tabletī. Pirms vai pēc zāļu lietošanas pieeja barībai nav jāierobežo. Lai nodrošinātu pareizas devas lietošanu, pēc iespējas precīzi jānosaka ķermeņa svars.

Vērsties pie veterinārāsta pēc padoma par ārstēšanas atkārtošanas un tās biežuma nepieciešamību.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

Katrū reizi neizlietotā, sadalītā tabletēs daļa jāliek atpakaļ atvērtā blistera vai sloksnītes nodalījumā un jāievieto atpakaļ kastītē.

Derīguma termiņš sadalītai tabletēi (divās daļās) pēc blistera atvēršanas: 2 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīviekiem:

Tā kā tabletēs ir ar garšu, tās jāuzglabā drošā, dzīviekiem nepieejamā vietā. Dzīviekiem, kas ir sliktā klīniskā stāvoklī, vai dzīviekiem ar smagu invāziju var attīstīties tādi simptomi kā caureja, vemšana, parazīti fekālijās un atvemtajās masās, sliks apmatojuma stāvoklis. Veterinārārstam ir jāizmeklē šādi dzīvieki pirms šo zāļu lietošanas. Novājinātiem vai stipri invadētiem kaķiem drīkst lietot tikai pēc atbildīgā veterinārāsta ieguvuma un riska attiecības novērtējuma.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:
Lai nodrošinātu personīgo higiēnu, personām, kuras dod tabletes tieši kaķim mutē vai pievieno tās dzīvnieka barībai, pēc tam rūpīgi jānomazgā rokas. Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma markējumu ārstam.
Ehinokokoze ir bīstama cilvēkiem. Ehinokokoze ir slimība, par kuru jāziņo Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijai (OIE), tai sagatavotas īpašas vadlīnijas par ārstēšanu, novērošanu un drošumu cilvēkiem, kas ir pieejamas atbilstošā kompetentā iestādē.

Grūsnība un laktācija:

Nelietot grūsnības laikā. Drīkst lietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot vienlaicīgi ar piperažīna savienojumiem.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidotī):

Pārsniedzot ieteicamo devu 5 reizes, pārdozēšanas simptomi netika novēroti. Pārsniedzot ieteicamo devu vairāk kā 5 reizes, novēroja tādas nepanesības pazīmes kā vemšanu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

03/2020

15. CITA INFORMĀCIJA

Zāles ir iepakotas blistera iepakojumā, kas sastāv no cieši noslēgtas alumīnija folijas vai sloksnes, kas izgatavota no daudzslāņu polietilēna/alumīnija folijas.

- Kastīte satur 1 blisteri ar 2 tabletēm (2 tabletes).
- Kastīte satur 2 blisters ar 2 tabletēm (4 tabletes).
- Kastīte satur 52 blisters ar 2 tabletēm (104 tabletes).
- Kastīte satur 1 blisteri ar 8 tabletēm (8 tabletes).
- Kastīte satur 3 blisters ar 8 tabletēm (24 tabletes).
- Kastīte satur 6 blisters ar 8 tabletēm (48 tabletes).
- Kastīte satur 13 blisters ar 8 tabletēm (104 tabletes).
- Kastīte satur 5 sloksnītes ar 2 tabletēm (10 tabletes).
- Kastīte satur 25 sloksnītes ar 2 tabletēm (50 tabletes).

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lietošanai dzīvniekiem.