

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/96/0314

Oxytocin 10 I.E./ml šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības turētājs un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Bela-pharm GmbH & Co.KG

Lohner Str. 19

49377 Vechta

Vācija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Oxytocin 10 I.E./ml šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, kazām, cūkām, suņiem un kaķiem

Oxytocine

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvā viela:

Oksitocīns	16,6 µg
(atbilst 10 IU)	

Adjuvants:

Hlorbutanola hemihidrāts	3,0 mg
--------------------------	--------

Palīgvielas:

Etiķskābe, etilspirts, ūdens.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Dzemdības kontrakciju stimulācijai dzemdību laikā un agrā pēcdzemdību periodā, dzemdes atonijas gadījumā.

Kēvēm:

Dzemdību indukcija, nometekļa aizture, ko izraisa dzemdes atonija, piena atdeves traucējumi.

Govīm:

Dzemdes atonija dzemdību un pēcdzemdību periodā, nometekļa aizture, ko izraisa dzemdes atonija, papildterapija endometrita ārstēšanā agrā pēcdzemdību periodā, piena atdeves traucējumi, piena atdeves stimulācijai mastītu terapijas laikā.

Aitām:

Papildterapija endometrita ārstēšanā agrā pēcdzemdību periodā.

Kazām:

Dzemdes kontrakciju stimulācijai pēc ķeizargrieziena.

Cūkām:

Dzemdes atonija dzemdību un pēcdzemdību periodā, nometekļa aizture, ko izraisa dzemdes atonija, dzemdību laikā saīsināšana, piena atdeves traucējumi, piena atdeves stimulācijai mastītu terapijas laikā.

Kucēm:

Papildterapija endometrita ārstēšanā agrā pēcdzemdību periodā.

Kaķenēm:

Dzemdības atonija, dzemdības kontrakciju stimulācija dzemdību laikā un agrā pēcdzemdību periodā, piena atdeves traucējumi.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot:

- ķēvēm, kas nav gatavas dzemdību norisei;
- dzemdību veicināšanai dzīvniekiem, ja ir nepietiekami atvēries dzemdes kakls;
- ja ir mehāniski dzemdību traucējumi, nepareiza augļa guļa, konvulsijas, nenovēršams dzemdes plīsums, dzemdes sagriešanās, izteikta bļodas kaula disproporcija, neattīstīti dzemdību ceļi;
- dzīvniekiem, kuriem ir pastiprināta jutība pret oksitocīnu.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dzemdes pārmērīgas kontrakcijas.

Dzemdes plīsums (īpaši gaļēdājiem).

Dzemdes pārmērīgas kontrakcijas, kas samazina asins piegādi nabas asinsvadiem, augļa hipoksija un dzīvotspējas samazināšanās.

Cūkām, lietojot oksitocīnu devā 5-10 IU intramuskulāri kopā ar prostaglandīniem dzemdību indukcijai, iespējami dzemdes krampji, pagarinātas dzemdības, priekšlaicīga placentas atdalīšanās.

Ja sīvēnmātēm ar oksitocīnu devā 22 IU uz 100 kg ķermeņa svara/dienā, ārstēta piena aizture, sīvēniem iespējama caureja, kas ilgst vienu dienu.

Ja novērojāt jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Zirgi (ķēves), liellopi (govis), aitas, kazas, cūkas (sīvēnmātes), suņi (kuces) un kaķi (kaķenes).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intravenozām, intramuskulārām un subkutānām injekcijām.

Vienreizējai vai nepieciešamības gadījumā atkārtotai ievadīšanai.

10 IU oksitocīna atbilst 1ml Oxytocin 10 I.E./ml.

Govīm:

Piena atdeves traucējumu gadījumā un mastītu papildterapijai 0,5-10 IU intravenozi vai 20-40 IU intramuskulāri vai subkutāni.

Dzemdes kontrakciju stimulācijai dzemdību laikā un agrā pēcdzemdību periodā, dzemdes atonijas gadījumā 5-10 IU intravenozi vai 1-20 IU intramuskulāri.

Dzemdes atonija pēcdzemdību periodā, dzemdes atonijas izraisīta placentas aizture, endometrita papildterapija agrā pēcdzemdību periodā 25 IU intravenozi.

Aitām:

Dzemdes kontrakciju stimulācijai dzemdību laikā un agrā pēcdzemdību periodā, dzemdes atonijas gadījumā 5-10 IU intravenozi vai 1-20 IU intramuskulāri.

Endometrita papildterapija agrā pēcdzemdību periodā 5-10 IU intravenozi.

Kazām:

Dzemdē konkrāciju stimulācijai dzemdību laikā un agrā pēcdzemdību periodā, dzemdē atonijas gadījumā 1-3 IU intramuskulāri vai subkutāni.

Dzemdē konkrāciju veicināšanai pēc ķeizargrieziēna 5 IU intravenozi vai intramuskulāri.

Kēvēm:

Dzemdību indukcijai, dzemdē konkrāciju stimulācijai dzemdību laikā un agrā pēcdzemdību periodā, dzemdē atonijas gadījumā 10 IU intravenozi vai 40 IU intramuskulāri.

Dzemdē atonijas izraisītas placēntas aiztūres gadījumā 50-60 IU stundā intravenozi piliēnu infūzijas ceļā.

Agalaktijas gadījumā 30-40 IU intramuskulāri.

Cūkām:

Dzemdē konkrāciju stimulācijai dzemdību laikā un agrā pēcdzemdību periodā, dzemdē atonijas gadījumā, dzemdību stimulācijai 1-10 IU intravenozi vai 20-25 IU intramuskulāri.

Agalaktija, mastītu papildterapijai 1-10 IU intravenozi vai 15 IU intramuskulāri.

Dzemdē atonijas gadījumā pēcdzemdību periodā 20- 40 IU intramuskulāri.

Dzemdē atonijas izraisītas placēntas aiztūres gadījumā 0,5 IU intramuskulāri, ievadīšanu atkārtot pēc dažām stundām.

Kucēm:

Dzemdē konkrāciju stimulācijai dzemdību laikā un agrā pēcdzemdību periodā, dzemdē atonijas gadījumā 0,15-1 IU intravenozi, intramuskulāri vai subkutāni.

Endometrita papildterapijai agrā pēcdzemdību periodā 3-10 IU subkutāni.

Agalaktijas gadījumā 0,2 -1 IU intravenozi, intramuskulāri vai subkutāni.

Kakēm:

Dzemdē konkrāciju stimulācijai dzemdību laikā un agrā pēcdzemdību periodā, dzemdē atonijas gadījumā 0,3 IU intramuskulāri vai subkutāni vai 0,1-0,2 IU intramuskulāri vai subkutāni un 10 -20 mg zāles ar spazmolītisku efektu, ievadīšanu atkārtot pēc 2-3 stundām.

Agalaktijas gadījumā 0,1-0,25 IU intravenozi, intramuskulāri vai subkutāni.

Ieteicams veikt ķeizargrieziēnu, ja dzemdē atonijas ārstēšanai oksitocīns ir ievadīts divas reizes un nav rezultātu.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Pēc intravenozas injekcijas: nulle diēnas.

Pēc intramuskulāras vai subkutānas injekcijas:

Zirgiem, govīm, aitām, kazām:

Gaļai un blakusproduktiem: 3 diēnas.

Pienam: nulle diēnas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 3 diēnas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2-8°C).

Sargāt no gaismas.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 7 diēnas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:
Intravenozi ievadīt lēni.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:
β-adrenolītiskie līdzekļi pastiprina oksitocīna darbību.
Prostaglandīni un oksitocīns potencē savstarpējo iedarbību.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pārdozēšana var izraisīt:

- īslaicīgu asinsvadu paplašināšanos un asinsspiediena pazemināšanos;
- ūdens aizturi;
- dzemdes hiperkontrakcijas, kas samazina asins piegādi nabas asinsvadiem, izraisa augļa hipoksiju un pazeminātu tā dzīvotspēju;
- tahikardiju;
- dzemdes plīsumu;
- ķēvēm dzemdību komplikācijas (stipras dzemdību sāpes un placentas aizturi);
- sīvēnmātēm dzemdību aizkavēšanos.

Šādos gadījumos nekavējoties pārtraukt Oxytocin 10 I.E./ml lietošanu.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

06/2018

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri:

(kastītē vai bez kastītes)

1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 6 x 10 ml, 10 x 10 ml, 12 x 10 ml, 1 x 50 ml, 6 x 50 ml, 12 x 50 ml, 1 x 100 ml, 6 x 100 ml, 12 x 100 ml.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti