

ZĀĻU APRAKSTS
V/NRP/05/1663

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bea Flea Shampoo

1% w/w šampūns ārīgai lietošanai suņiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvā viela:

Permetrīns 1% w/w (masas %)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

Šampūns

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Mērķa sugas

Suņi

4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Ārīgai lietošanai suņiem blusu invāzijas gadījumā.

4.3 Kontrindikācijas

Piesardzības nolūkā nerekomendē lietot:

- slimiem dzīvniekiem un dzīvniekiem atveseļošanās periodā;
- dzīvniekiem ar paaugstinātu jutību pret šo līdzekli;
- dzīvniekiem jaunākiem par 6 mēnešiem;
- grūsniem dzīvniekiem vai tādiem, kuri varētu kļūt grūсни, un laktējošiem dzīvniekiem;
- dzīvniekiem ar smagām ādas slimībām.

Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem.

Nedrīkst lietot kaķiem!(skat. apakšpunktu 4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā).

4.4 Īpaši brīdinājumi par katru mērķa sugu

Nepieļaut suņa sevis laizīšanu līdzekļa pielietošanas laikā.

Nevēlamās blakusparādības, piemēram, tādas kā siekalošanās, putu izdalīšanās no mutes vai hiperaktivitāte, parādās reti.

4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Novērst preparāta iekšķīgu lietošanu, galvenokārt, lai suns nelaizītu līdzekļa aplikācijas vietu, kā arī novērst citu dzīvnieku saskarsmi ar apstrādāto dzīvnieku.

Nedrīkst lietot kaķiem! Šis preparāts ir ļoti indīgs kaķiem un var būt nāvējošs. Kaķi nav spējīgi metabolizēt permetrīnu. Lai novērstu nejaušu kontaktu ar preparātu, turiet kaķus nošķirti no apstrādātajiem suņiem, kamēr aplikācijas vieta ir nožuvusi. Ir svarīgi nodrošināt, lai kaķi nelaizītu apstrādātā suņa aplikācijas vietu. Ja tas noticis, nekavējoties meklējiet veterinārārsta palīdzību.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Izvairīties no tiešas saskares ar ādu. Šampūna lietošanas laikā izmantot cimdus.

4.6 Nevēlamās reakcijas (biežums un bīstamība)

Vairākumam dzīvnieku apstrādāšana ar šo līdzekli neizsauc nevēlamās blakusparādības. Retos gadījumos var parādīties sekojošas blakusparādības:

- izteikts jutīgums;
- muskuļu trīsas vai raustīšanās;
- koordinācijas traucējumi;
- vemšana;
- siekalošanās;
- konvulsijas;
- hiperaktivitāte;
- putu izdalīšanās no mutes.

4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav pietiekošu datu par permetrīna ietekmi uz dzīvniekiem grūsnības vai laktācijas laikā, tāpēc šīs zāles nedrīkst lietot dzīvniekiem grūsnības vai laktācijas laikā.

4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem.

4.9 Devas un lietošanas veids

Suņiem līdz 5 kg ķermeņa masas –	1½ šampūna vāciņa (50 ml)
Suņiem 5–10 kg ķermeņa masas –	3 šampūna vāciņi (100 ml)
Suņiem 11–20 kg ķermeņa masas –	4½ šampūna vāciņi (150 ml)
Suņiem vairāk par 20 kg ķermeņa masas –	6 šampūna vāciņi (200 ml)

Samitriniet apmatojumu ar siltu ūdeni un iemasējiet vajadzīgo šampūna daudzumu apmēram 2 minūtes. Mazgājiet dzīvnieka ķermeni, neskarot ausis, degunu un muti. Ļaujiet šampūnam iedarboties 5 minūtes. Rūpīgi izskalojiet šampūnu un labi izslaukiet apmatojumu, berzējot dzīvnieku ar dvielī. Neatkārtot dzīvnieka apstrādi 2 nedēļu laikā.

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Simptomi: nemiers, koordinācijas traucējumi, hiperaktivitāte, spēku izsīkums, apmatojuma izkrišana, acu asarošana, siekalošanās, paralīze.

Neatliekamā rīcība: meklējiet medicīnisku palīdzību.

Antidoti: nav īpašu antidotu akūtas pārdozēšanas gadījumos. Ārstēšanai jābūt vērstai uz simptomu novēršanu.

4.11 Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nav piemērojams.

5. FARMAKOLOGISKĀS IMUNOLOGISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: Pretektoparazītu līdzekļi, insekticīdi un repelenti.
ATĶ vet kods: QP53AC04

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Permetrīns iznīcina uz dzīvnieka ķermeņa esošās blusas. Permetrīns saglabā savu efektivitāti arī pēc dzīvnieka mazgāšanas, jo tas paliek uz dzīvnieka ādas un apmatojuma. Blusas, kas uzbrūk dzīvniekam, nonāk kontaktā ar permetrīnu un tiek iznīcinātas.

5.2 Farmakokinētiskie dati

Permetrīns ir insekticīds ar nesistēmisku iedarbību.

Ietekme uz vidi

Preparāts nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo ir bīstams zivīm un citiem ūdenī dzīvojošiem organismiem. Par apstrādātiem dzīvniekiem skat. apakšpunktā 4.5

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Tetranils CO-40, nātrija laurilēstera sulfāts, lauril-ēster-2-amīds MEA, nātrija laurilēster-11-karboksilāts, polioksil-40-hidrogenizēta rīcineļļa, briljantzilais FCF (E-133), piparmētras eļļa, attīrīts ūdens, nātrija hlorīds.

6.2 Nesaderība

Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem.

6.3 Derīgums

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā – 3 gadi.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Neuzglabāt temperatūrā virs 25° C, neatdzēsēt vai nesasaldēt.
Uzglabāt oriģinālā, cieši noslēgtā iepakojumā.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

Zema blīvuma polietilēna pudele 200 ml ar polipropilēna vāciņu un zema blīvuma polietilēna korķi.

6.6 Īpaši norādījumi rīcībai ar neizlietotām veterinārām zālēm vai to atkritumiem, kas paliek pēc to lietošanas

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām bīstamiem atkritumiem.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte
The Netherlands
tālr.: 0031 (0)572 348 834
fakss: 0031 (0)572 348 835
e-pasts: hqb@beaphar.nl

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

V/NRP/05/1663

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

26/10/2005
23/11/2009

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

23/11/2009

TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Bezrecepšu veterinārās zāles.