

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/94/0089

Chorulon

1500 IU liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai liellopiem, zirgiem, suņiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Nīderlande

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1a

85716 Unterschleissheim

Vācija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Chorulon

1500 IU liofilizāts un šķīdinātājs šķīduma injekcijām pagatavošanai liellopiem, zirgiem, suņiem

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viens flakons liofilizāta satur:

Aktīvā viela:

Cilvēku horiona gonadotropīns (cHG) 1500 IU

Palīgviela(s):

Bezūdens liofilizētas palīgvielas līdz 100 %

4. INDIKĀCIJA(-S)

- Ovulācijas ierosināšanai un sinhronizācijai ķēvēm un kucēm.
- Olnīcu cistu ārstēšanai govīm un telēm.
- Aupauglošanās uzlabošanai govīm, ja aupauglošanās ir zema (atkārtota apsēklošana, meklēšanās stress).
- Kriptorhisma un libido trūkuma ārstēšanai vīriešu kārtas suņiem.

9. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav zināmas.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUPARĀDĪBAAS

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (teles un govis), zirgi (ķēves), suņi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LI ETOŠANAS VEIDA UN METODEDES

Injicē intramuskulāri vai intravenozi.

Izšķīdina ar pievienoto šķīdinātāju, pārliedzinoties, ka liofilizāts ir pilnīgi izšķīdis.

Ievērot aseptisku.

Dzīvnieku sugas	Indikācija	Devas un lietošanas veids
Liellopi (govis, teles)	Apaugļošanās uzlabošana	1500 IU intramuskulāri vai intravenozi mākslīgās apsēklošanas (MA) vai lecināšanas laikā un/vai 6 dienas vēlāk.
	Olnīcu cistas ovulācijas ierosināšana	3000 IU intravenozi
Zirgi (ķēves)	Ovulācijas ierosināšana (folikuli $\geq 3,5$ cm diametrā) vai sinhronizācija	1500-3000 IU intramuskulāri vai intravenozi 24 stundas pirms MA vai lecināšanas.
Kuces	Ovulācijas ierosināšana, lai ārstētu anestrus Kavēta ovulācija, ieilgusi meklēšanās	Pēc grūsno ķēvju seruma gonadotropīna lietošanas, 500 IU intramuskulāri vai intravenozi pirmajā meklēšanās dienā. 100-800 IU /dienā intramuskulāri, atkārto līdz izzūd izdalījumi no vagīnas.
Vīriešu kārtas suņi	Kriptorhisms Libido trūkums	100-500 IU intramuskulāri divas reizes nedēļā, līdz 6 nedēļas pēc kārtas. 100-500 IU intramuskulāri 6-12 stundas pirms lecināšanas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Līdzīgi kā visiem olbaltumvielas saturošiem līdzekļiem, ļoti reti īsi pēc ievadīšanas var novērot anafilaktiskā tipa reakcijas. Šādos gadījumos ārstēšanai var lietot adrenalīnu vai glikokortikosteroīdus. Injekcijas vietā jāievēro aseptiska.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: Nulle dienas.

Pienam: Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Pēc atšķaidīšanas uzglabāt temperatūrā no 2 - 8°C līdz 24 stundām.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

cHG tiek lietots humānajā medicīnā jau gadu desmitiem. Nav nozīmīgas atšķirības cHG iedarbībā cilvēkiem un dzīvniekiem: pēc injekcijas cHG spēj ietekmēt auglību cilvēkiem.

Lietojot Chorulon rūpējies, lai novērstu pašinjekciju.

Zāļu iedarbība uz lietotāju tomēr ir minimāla, jo tiek lietota injekciju forma un vienas injekcijas terapeitiskā shēma.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Nejauši izšķakstot uz ādas, nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un ūdeni.

Preparāts ir droši lietojams agrā grūsnības laikā, kā arī laktējošiem dzīvniekiem.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterināro zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

07/2015

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.