

MARKĒJUMS
V/MRP/11/0055

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba 50 ml, 100 ml, 250 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EXCENEL Evo 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur 50 mg ceftiofūra (hidrohlorīda veidā).

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml
100 ml
10 x 50 ml
10 x 100 ml
250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas un liellopi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas, kārtīgi saskalīniet flakonu, bet ne ilgāk kā 60 sekundes vai līdz brīdim, kamēr nenovēro cieto daļiņu nogulsnes.

Cūkām: intramuskulāri 3 mg ceftiofūra/kg ķermeņa svara/dienā 3 dienas, t. i., 1 ml/16 kg ķermeņa svara katrā injekcijā.

Liellopiem: elpceļu slimību gadījumā subkutāni 1 mg ceftiofūra/kg ķermeņa svara/dienā, t. i., 1 ml/50 kg ķermeņa svara katrā injekcijā 3 līdz 5 dienas, akūtas starppirkstu nekrobakteriozes gadījumā 3 dienas un akūta pēcdzemdību metrīta gadījumā 5 dienas pēc kārtas 10 dienu laikā pēc atnešanās.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Cūkām: gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

Liellopiem: gaļai un blakusproduktiem: 6 dienas, pienam: nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas kārtīgi saskaliniet flakonu, lai zāles iegūst suspensijas formu.

Nelietot dzīvniekiem, kuriem agrāk ir bijusi paaugstināta jutība pret ceftiofūru un citām β-laktāmu antibiotikām vai to palīgvielām. Neinjicēt intravenozi.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem; Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai; Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība); Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā: Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Iznīcināšanas datums:

Pēc caurduršanas izlietot 28 dienu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuri neizlietoto veterināro zāļu atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIĒKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Beļģija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/11/0055

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EXCENEL Evo 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur 50 mg ceftiofūra (hidrohlorīda veidā).

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Deva:

Liellopiem: subkutāni 1 mg ceftiofūra/kg ķermeņa svara/dienā.

Cūkām: intramuskulāri 3 mg ceftiofūra/kg ķermeņa svara/dienā.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Cūkām: gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

Liellopiem: gaļai un blakusproduktiem: 6 dienas, pienam: nulle stundas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Iznīcināšanas datums:

Pēc caurduršanas izlietot 28 dienu laikā.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

9. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Beļģija

16. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/11/0055

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 100 ml, 250 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EXCENEL Evo 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofūrs (hidrohlorīda veidā)

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur 50 mg ceftiofūra (hidrohlorīda veidā).

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100, 250 ml vai kartona kārba, kas satur 10 x 50 ml vai 10 x 100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas un liellopi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas, kārtīgi saskaliniet flakonu, bet ne ilgāk kā 60 sekundes vai līdz brīdim, kamēr nenovēro cieto daļiņu nogulsnes.

Cūkām: intramuskulāri 3 mg ceftiofūra/kg ķermeņa svara/dienā t. i., 1 ml/16 kg ķermeņa svara katrā injekcijā.

Liellopiem: subkutāni 1 mg ceftiofūra/kg ķermeņa svara/dienā, t. i., 1 ml/50 kg ķermeņa svara katrā injekcijā.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Cūkām: gaļai un blakusproduktiem: 2 dienas.

Liellopiem: gaļai un blakusproduktiem: 6 dienas, pienam: nulle stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas kārtīgi saskaliniet flakonu, lai zāles iegūst suspensijas formu.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Iznīcināšanas datums:

Pēc caurduršanas izlietot 28 dienu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Beļģija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/11/0055

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot