

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/MRP/19/0047**

**Parofor Crypto 140 000 IU/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai liellopiem pirms atgremošanas  
procesu sākšanās**

**1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES  
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA  
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Huvepharma NV  
Uitbreidingstraat 80  
2600 Antwerp  
Beļģija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Biovet JSC  
39 Petar Rakov Str  
4550 Pesthera  
Bulgārija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Parofor crypto 140 000 IU/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai liellopiem pirms atgremošanas procesa sākšanās

*Paromomycinum*

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

**Viens ml satur:**

**Aktīvā viela:**

140 000 IU paromomicīna aktivitātes

**Palīgvielas:**

Metilparahidroksibenzoāts (E218)	1,0 mg
Propilparahidroksibenzoāts	0,1 mg
Nātrija metabisulfīts (E223)	4,0 mg

Dzidrs, dzeltens līdz dzintarkrāsas šķīdums.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Diagnosticētas *Cryptosporidium parvum* izraisītas diarejas sastopamības mazināšanai.

Teļiem šīs veterinārās zāles dot tikai tad, ja to fēcēs ir konstatētas kriptosporīdiju oocistas un pirms diarejas sākšanās.

Paromomicīns samazina oocistu izdalīšanos ar fēcēm.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot dzīvniekiem, kam zināma pastiprināta jutība pret paromomicīnu, citiem aminoglikozīdiem vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot, ja ir nieru vai aknu darbības traucējumi.  
Nelietot dzīvniekiem, kuriem jau notiek atgremošanas procesi.

## **6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Aminoglikozīdu antibiotikas, piemēram, paromomicīns, var izraisīt oto- un nefrotoksicitāti. Ja novērojat jebkādas blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka šīs zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Iespējams ziņot arī nacionālā ziņošanas sistēmā, kas atrodama Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļa vietnē [www.pvd.gov.lv](http://www.pvd.gov.lv).

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi (teļi pirms atgremošanas procesu sākšanās).

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES**

Iekšķīgai lietošanai.

Deva: 35 000 IU paromomicīna/ kg ķ.sv. dienā 7 dienas pēc kārtas, t. i., 2,5 ml zāļu/10 kg ķ.sv. dienā 7 dienas pēc kārtas.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Lai nodrošinātu pareizas zāļu devas ievadīšanu, jāizmanto vai nu šļirce, vai atbilstoša ierīce iekšķīgai lietošanai, un veterinārās zāles jāievada tieši dzīvnieka mutē.

Lai nodrošinātu pareizas zāļu devas ievadīšanu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Tā kā paromomicīns uzkrājas aknās un nierēs, neveikt atkārtotu ārstēšanas kursu ierobežojumu periodā.

Gaļai un blakusproduktiem: 62 dienas.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz pudeles pēc "EXP". Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 3 mēneši.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

### **Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai**

Lauka pētījumos, kuros tiek vērtēts šo veterināro zāļu iedarbīgums pret ar kriptosporidiozi saistītu diareju, ārstēto dzīvnieku grupās 7 dienas ilgajā ārstēšanas periodā diareja noverota no 23% līdz 32% teļu, bet neārstēto dzīvnieku grupās - 53% līdz 73% teļu.

## **Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā**

### Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Zāļu lietošana ir jāapvieno ar labturības prasību ievērošanu, piemēram, labu higiēnu, atbilstošu ventilāciju un dzīvnieku nepārblīvēšanu. Saimniecībās jāizvairās no zāļu atkārtotas lietošanas, uzlabojot labturības prasību ievērošanu, kā arī veicot tīrīšanu un dezinfekciju.

Aminoglikozīdi ir kritiski nozīmīgi arī cilvēku ārstēšanā. Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju izplatība, kuras rezistentas pret paromomicīnu un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar aminoglikozīdiem iespējamās krusteniskās rezistences dēļ.

Nav pētīts šo veterināro zāļu nekaitīgums dzīvniekiem līdz 3 dienu vecumam.

### Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Šīs zāles satur paromomicīnu, kas dažiem cilvēkiem var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību (alerģiju) pret paromomicīnu vai citiem aminoglikozīdiem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Izvairīties no zāļu saskares ar ādu un acīm.

Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, izmantot individuālo aizsargaprīkojumu - aizsargtērpu un necaurlaidīgus cimdus.

Ja zāles nejauši saskaras ar ādu vai acīm, skalot ar lielu daudzumu tīra ūdens.

Ja pēc saskares rodas tādi simptomi kā, piemēram, izsitumi, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt šo brīdinājumu ārstam. Sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana ir nopietnāki simptomi, un nepieciešams nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Rīkojoties ar šīm zālēm, nedrīkst ēst, dzert un smēķēt.

Nenorīt. Ja zāles tiek nejauši norītas, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt ārstam iepakojuma marķējumu.

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

### Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Nav piemērojams.

### Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vispārējās anestēzijas līdzekļi un miorelaksanti palielina aminoglikozīdu neirobloķējošo efektu. Tas var izraisīt paralīzi un apnoju.

Nelietot vienlaikus ar spēcīgas iedarbības diurētiskajiem līdzekļiem un vielām ar iespējamu oto- vai nefrotoksisku iedarbību.

### Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nelietot ilgāk par 7 dienām. Teļiem vecumā no 2 līdz 5 nedēļām pārdozēšana, lietojot vairāk nekā 35 000 IU paromomicīna/kg ķ.sv., var radīt bojājumus kuņģa-zarnu traktā (čūlu un pustulu veidošanos, hronisku iekaisumu ar hiperplāziju), galvenokārt, spureklī (*rumen*) un aceknī (*reticulum*). Ziņots par zobu griešanu un samazinātu ēstgribu. Atkārtota pārdozēšana var izraisīt nāvi.

### Nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā kopā ar citām veterinārajām zālēm.

### Ietekme uz vidi

Aktīvā viela paromomicīna sulfāts ir ļoti noturīga augsnē.

## **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju, vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

08/2019

**15. CITA INFORMĀCIJA**

Iepakojumu izmērs: pudeles, kuru tilpums ir

125 ml

250 ml

500 ml

1 l

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Recepšu veterinārās zāles.