

MARKĒJUMS
V/MRP/15/0020

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

1 aerosola konteiners ar 211 ml
12 x 1 aerosola konteiners ar 211 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Animedazon 2,45% uz ādas izsmidzināms aerosols, suspensija liellopiem, aitām un cūkām
Chlortetracycline hydrochloride

2. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katrs aerosola konteiners satur:

Aktīvā viela:

Hlortetraciklīna hidrohlorīds 3,210 g (atbilst 2,45%)
(atbilst 2,983 g hlortetraciklīna)

Palīgviela(s):

Patentzilais V 85% (E 131): 0,23 g
Izobutāns (propelents) 92,2 g

3. ZĀĻU FORMA

Uz ādas izsmidzināms aerosols, suspensija

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

211 ml
12 x 211 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas un cūkas.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Lietošanai uz ādas.

Izsmidzināt 3 sekundes, līdz ārstējamā zona ir vienmērīgi iekrāsota, attālums no apsmidzināmās zonas - apmēram 15 - 20 cm.

Nagu infekcijas: atkārtot pēc 30 sekundēm.

Pēdu puve un starpnagu nekrobakterioze: apsmidzināt ar 30 sekunžu intervālu 1 vai 2 reizes dienā.
Atkārtot no 1 līdz 3 dienām atkarībā no traumas smaguma un stāvokļa uzlabošanās ātruma.

Virspusējas brūces: vienreizēja apsmidzināšana, ja brūce piesārņota ar vielām, kas ir jutīgas pret hlortetraciklīnu.

Starpnagu ādas dermatīts: apsmidzināt 2 reizes ar 30 sekunžu intervālu 3 dienas pēc kārtas, 1 vai 2 reizes dienā.

Pirms izsmidzināšanas kārtīgi sakratīt trauku.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem, pienam : nulle dienas.

Nelietot uz tesmeņa dzīvniekiem laktācijas laikā, ja pienu paredzēts lietot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Šīs zāles var izraisīt nopietnu acu kairinājumu. Aizsargāt acis un seju. Valkāt šķidrumus necaurlaidīgus cimdus.

Neieelpot aerosolu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Ja notikusi nejauša saskare ar acīm vai norīšana, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt ārstam trauku.

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Trauks atrodas zem spiediena. Karsējot var uzsprāgt.

Aizsargāt no tiešas saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C.

Sargāt no karstuma/karstām virsmām/dzirkstelēm/atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

Neizsmidzināt uz atklātas liesmas vai citiem aizdegšanās avotiem.

Necaurdurt un nededzināt trauku pat pēc zāļu izlietošanas.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neatdzēsēt vai nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Bīstami



Apzīmējums "Īpaši viegli uzliesmojošs".

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/15/0020

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

18. CITA INFORMĀCIJA

Izplatītājs:
A/S Dimela Veta Latvija
Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads
LV- 2167,
Latvija