

MARKĒJUMS
V/MRP/10/0003

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA (ETIĶETE UZ FLAKONA)

100, 250 ml flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ceftiomax 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofur (as ceftiofur hydrochloride)

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Ceftiofūrs (kā ceftiofūra hidrohlorīds) 50 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml
250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas un liellopi

6. INDIKĀCIJA(S)

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai lietošanai cūkām un subkutānai lietošanai liellopiem
Pirms lietošanas sakratīt.
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Cūkas: gaļai un blakusproduktiem – 5 dienas.

Liellopi: gaļai un blakusproduktiem - 8 dienas.
Pienam – nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Penicilīni un cefalosporīni dažreiz var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas.
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīguma termiņš: MM/YY beigas
Derīguma termiņš pēc tiešā iepakojuma pirmās atvēršanas: 28 dienas.
Pēc caurduršanas izlietot līdz:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25° C.
Neatdzesēt un nesasaldēt.
Uzglabāt ārējā kartona iepakojumā

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem
Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Laboratorios Calier, S.A.
Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)
Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Spānija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/MRP/10/0003

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA (KARTONA KASTE)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ceftiomax 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofur (as ceftiofur hydrochloride)

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Ceftiofūrs (kā ceftiofūra hidrohlorīds) 50 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 pudelīte 100 ml tilpumā

1 pudelīte 250 ml tilpumā

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas un liellopi

6. INDIKĀCIJA(S)

Cūkām:

Pret ceftiofūra hidrohlorīdu jutīgu *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* un *Streptococcus suis* baktēriju izraisītu elpošanas ceļu slimību ārstēšanai.

Liellopiem:

- Pret ceftiofūra hidrohlorīdu jutīgu *Mannheimia haemolytica* (kādreizējo *Pasteurella haemolytica*), *Pasteurella multocida* un *Histophilus somni* (kādreizējo *Haemophilus somnus*) baktēriju izraisītu elpošanas ceļu slimību ārstēšanai.

- Pret ceftiofūra hidrohlorīdu jutīgu *Fusobacterium necrophorum* un *Bacteroides melaninogenicus* (*Porphyromonas asaccharolytica*) baktēriju izraisītas akūtas starppirkstu nekrobakteriozes (panarīcija, nagu puves) ārstēšanai.

- Bakterioloģiskas izcelsmes akūta pēcdzemdību (dzemdību) metrīta, kas saistīts ar *Escherichia coli*, *Trueperella pyogenes* un *Fusobacterium necrophorum* un jutīgs pret ceftiofūra hidrohlorīdu, ārstēšanai 10 dienu laikā pēc atnešanās.

Indikācija attiecas uz gadījumiem, kad vēlmais ārstnieciskais efekts nav ticis sasniegts, lietojot pirmās izvēles pretmikrobās zāles.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Intramuskulārai lietošanai cūkām un subkutānai lietošanai liellopiem

Pirms lietošanas sakratīt

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Cūkas: gaļai un blakusproduktiem – 5 dienas.
Liellopi: gaļai un blakusproduktiem - 8 dienas.
Pienam – nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Penicilīni un cefalosporīni dažreiz var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas.
Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju. Uzmanieties, lai izvairītos no nejaušas pašinjekcijas.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīguma termiņš: MM/YY beigas
Derīguma termiņš pēc tiešā iepakojuma pirmās atvēršanas: 28 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Neuzglabāt temperatūrā virs 25° C.
Neatdzesēt un nesasaldēt.
Uzglabāt ārējā kartona iepakojumā

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem
Recepšu veterinārās zāles

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Laboratorios Calier, S.A.
Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà)
Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Spānija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/MRP/10/0003

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija