

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/05/1637

Ampicillin 20% suspensija injekcijām liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN
ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Alfasan International BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Nīderlande
Tel.: 0031-348 416945

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ampicillin 20% suspensija injekcijām liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem
Ampicillin

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml suspensijas satur:

Aktīvā viela:

Ampicilīna trihidrāts 200 mg

4. INDIKĀCIJA(-S)

Liellopiem un cūkām:

- Elpceļu infekciju ārstēšanai, ko ierosina pret ampicilīnu jutīgi *Pasteurella* spp., *Streptococcus* spp., *E.coli*, *Klebsiella* spp.
- Urīntrakta infekciju ārstēšanai, ko ierosina pret ampicilīnu jutīgas gramnegatīvas baktērijas.
- Gastrointestinālā trakta infekciju ārstēšanai, ko ierosina pret ampicilīnu jutīgi *E.coli*.
- Mastīts, ko ierosina pret ampicilīnu jutīgas enterobaktērijas.
- Pret ampicilīnu jutīgu Streptokoku ierosinātas infekcijas, tādas kā artrīts un meningīts.

Suņiem un kaķiem:

- Elpceļu infekciju ārstēšanai, ko ierosina pret ampicilīnu jutīgi *E.coli*, hemolītiskie streptokoki, *Staphylococcus aureus*, *Pasteurella* spp. un *Proteus* spp.
- Ādas un brūču infekciju ārstēšanai, ko ierosina pret ampicilīnu jutīgi grampozitīvie koki.
- Urīntrakta infekciju ārstēšanai, ko ierosina pret ampicilīnu jutīgi *Proteus* spp., *E.coli* un grampozitīvie koki.
- Gastrointestinālā trakta infekciju ārstēšanai, ko ierosina pret ampicilīnu jutīgi *E.coli* un grampozitīvie koki.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ampicilīns ir pussintētiskais penicilīns un tas var izraisīt alerģisku reakciju. Ja parādās alerģiska reakcija, ievadīt epinefrīnu un/vai steroīdus.

Injekcijas vietā var parādīties neliels iekaisums.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas, suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Intramuskulārām injekcijām.

Devas:

Liellopiem: 20 mg uz kg ķermeņa svara dienā, sadalot divās devās, lieto 3-5 dienas.

Cūkām: 20 mg uz kg ķermeņa svara dienā, lieto 3-5 dienas.

Suņiem, kaķiem: 20-30 mg uz kg ķermeņa svara dienā, sadalot divās devās, lieto vismaz 5 dienas.

Lai nodrošinātu precīzas devas noteikšanu un izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas, ķermeņa svars jānosaka iespējami precīzāk.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Smagas infekcijas gadījumā devu var dubultot.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopi:

Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas.

Pienam: 2 dienas.

Cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: 14 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt istabas temperatūrā (15 - 25°C). Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.

Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem. Ja tas nav iespējams, terapijai jāpamatojas uz vietējo (reģionālā, fermas līmeņa) epidemioloģisko informāciju par mērķa baktērijas jutību. Lietojot zāles neatbilstoši norādījumiem zāļu aprakstā, var paaugstināties pret benzilpenicilīnu rezistentu baktēriju izplatība un, iespējamās krusteniskās rezistences dēļ, var samazināties ārstēšanas ar citiem beta laktāma pretmikrobu līdzekļiem (penicilīni un cefalosporīni) efektivitāte.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret ampicilīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjicēšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Antagonisms ar bakteriostatiskiem aģentiem, tādiem kā tetraciklīni, hloramfenikols, makrolīdi, linkomicīns, tiamulīns.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

06/2017

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.