

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/11/0043
Ungezieferband Hund 3,9 g kakla siksna suņiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Beaphar B.V.
Drostenkamp 3
8101 BX Raalte
Nīderlande

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ungezieferband Hund 3,9 g kakla siksna suņiem
Diazinon

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena kakla siksna (65 cm) satur:

Aktīvā viela:
Diazinons 3,9 g

Palīgvielas: polivinilhlorīds, epoksidizēta sojas pupiņu eļļa, bārija laurāts, piparmētru eļļa. Pigmenta kvēpi (melns), eritrozīnu E-127 (sarkans), vai titāna dioksīds E-171, dzeltenais pigments 83 un irgalite dzeltens BAW (dzeltens) - attiecīgajai kakla siksna krāsai.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Blusu (*Ctenocephalides felis*) un/vai ērcu (*Ixodes ricinus*) invāzijas kontrolei suņiem.
Kakla siksna pretektoparazitārā iedarbība ir novērojama 5.-10. dienā no uzlikšanas brīža, un tā ilgst līdz 6 mēnešiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot suņiem līdz 6 mēnešu vecumam.

Nelietot slimiem dzīvniekiem, dzīvniekiem atveseļošanās periodā vai dzīvniekiem ar redzamiem plašiem ādas bojājumiem.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot dzīvniekiem, kam konstatēta sirds mazspēja, bronhu spazmas, krampji, aknu vai nieru saslimšanas.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Reti novēro īslaicīgas vietējas ādas reakcijas (matu izkrišana, nieze, apsārtums).

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));

- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ārīgai lietošanai.

Lietošana: aplikāt vienu kakla siksnu ap suņa kaklu.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Aplikāt kakla siksnu ap suņa kaklu un noregulēt tā, lai starp kaklu un kakla siksnu paliek 2-3cm liela atstarpe. Lieko kakla siksnas galu nogriež, ņemot vērā iespējamo dzīvnieka ķermeņa svara pieaugumu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt oriģinālā, cieši noslēgtā iepakojumā temperatūrā līdz 25 °C.

Neatdzēsēt vai nesasaldēt.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Neļaut dzīvniekiem košļāt kakla siksnu.

Nevar izslēgt atsevišķu ērcu pieķeršanās iespēju pēc kakla siksnas uzlikšanas. Šī iemesla dēļ nevar pilnībā izslēgt ar ērcēm saistītu slimību pārnesšanas risku, ja apstākļi ir nelabvēlīgi.

Lai palīdzētu izvairīties no blusu atkārtotas invāzijas dzīvnieka guļvietā un vietās, kur dzīvnieks regulāri uzturas, piemēram, paklāji un mīkstās mēbeles, regulāri jāapstrādā ar piemērotu insekticīdu un jātīra ar putekļusūcēju.

Kakla siksnā, kas ap dzīvnieka kaklu aplikta pārāk cieši, var izraisīt ādas iekaisumu. Kakla siksnā ir ūdensizturīga. Lietus, peldēšanās vai mazgāšanās laikā, kakla siksnas terapeitiskā iedarbība nemazinās.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Diazinons ir fosfororganiskais savienojums: nerīkoties ar kaklasiksnu, ja ārsts noteicis, ka nedrīkst strādāt ar antiholīnesterāzēm. Personām ar pastiprinātu jutību pret kakla siksnas sastāvdaļām vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Ja pēc rīkošanās ar šo kaklasiksnu ir slikta pašsajūta, jāvēršas pie ārsta.
Kaklasiksnu no iepakojuma drīkst izņemt tikai tad, kad esat gatavs to lietot. Glabāt atstātus no pārtikas produktiem.

Pēc kakla siksņas uzlikšanas, mazgāt rokas ar ziepēm un aukstu ūdeni.

Neļaut bērniem spēlēties ar kakla siksnu un to košļāt.

Neēst, nedzert un nesmēķēt kakla siksņas lietošanas laikā.

Pēc kaklasiksņas lietošanas rūpīgi nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.

Grūsnība, laktācija:

Nelietot kucēm grūsnības un laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nelietot vienlaicīgi ar citiem organiskiem fosfora vai karbamātu savienojumiem.

Nelietot vienlaicīgi ar citiem insekticīdiem.

Nelietot vienlaikus ar organiskā fosfora savienojumiem, morfīnu, teofilīnu, aminofilīnu, lielu daudzumu intravenozā šķīduma, fenotiazīnus saturošām zālēm, pirantela palmoātu.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Simptomi: acu asarošana, siekalošanās, muskuļu krampji, vemšana, refleksu zudums, koma, cianoze.

Neatliekamā darbība: noņemt kakla siksnu un sazināties ar veterinārārstu.

Antidots: atropīns.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

05/2018

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "Beaphar Latvija"

Kleistu iela 18C-3

Rīga, LV-1067

Tel. +37122047870