

**MARKĒJUMS
V/DCP/12/0046**

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kaste: 50 ml, 100 ml, 250 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefenil RTU 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofur hydrochloride

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Ceftiofūrs (hidrohlorīda veidā) 50 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml
100 ml
250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas un liellopi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Cūkām:

Viena intramuskulāra injekcija 3 dienas pēc kārtas.

Liellopiem:

Viena subkutāna injekcija 3 – 5 dienas pēc kārtas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas.

Pienam: nulle stundas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc caurduršanas/atvēršanas izlietot līdz _____

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Šīs zāles nesatur pretmikrobu konservantus.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/12/0046

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

**MARKĒJUMS
V/DCP/12/0046**

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Flakonu aizsargplēve: 100 ml un 250 ml flakons

Flakona pamatteksts

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefenil RTU 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofur hydrochloride

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Ceftiofurs (hidrohlorīda veidā) 50 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml
250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas un liellopi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADIŠANAS VEIDS(-I)

Cūkām:

Viena intramuskulāra injekcija 3 dienas pēc kārtas.

Liellopiem:

Viena subkutāna injekcija 3 – 5 dienas pēc kārtas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas; pienam: nulle stundas.

Cūkām: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc caurduršanas/atvēršanas izlietot līdz _____

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Šīs zāles nesatur pretmikrobu konservantus.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/12/0046

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

MARKĒJUMS
V/DCP/12/0046

Flakona paplašinātais teksts- 1. lapa

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefenil RTU 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofur hydrochloride

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Ceftiofūrs (hidrohlorīda veidā) 50 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml
250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas un liellopi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADIŠANAS VEIDS(-I)

Cūkām:

Viena intramuskulāra injekcija 3 dienas pēc kārtas.

Liellopiem:

Viena subkutāna injekcija 3 – 5 dienas pēc kārtas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas; pienam: nulle stundas.

Cūkām: gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc caurduršanas/atvēršanas izlietot līdz _____

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz kastītes un flakona marķējuma pēc EXP.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Šīs zāles nesatur pretmikrobu konservantus.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/12/0046

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

Flakona paplašinātais teksts- 2.-5. lapa

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Manufacturing Ltd.
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefenil RTU 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofur hydrochloride

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Ceftiofūrs (hidrohlorīda veidā) 50 mg/ml
Balta līdz dzeltenīga eļļas suspensija.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Sekojošu infekciju, ko izraisījušas pret ceftiofūru jutīgas baktērijas, ārstēšanai:

Cūkām:

Pret ceftiofūru jutīgu *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* un *Streptococcus suis* izraisītu bakteriālu elpceļu slimību ārstēšanai.

Liellopiem:

Pret ceftiofūru jutīgu *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* un *Haemophilus somnus* izraisītu bakteriālu elpceļu slimību ārstēšanai.

Pret ceftiofūru jutīgu *Fusobacterium necrophorum* un *Porphyromonas asaccharolytica* (iepriekš *Bacteroides melaninogenicus*) izraisītas akūtas starppirkstu nekrobakteriozes (panarīcijs, nagu puve) ārstēšanai.

Pret ceftiofūru jutīgu *Trueperella pyogenes* (iepriekš *Arcanobacterium pyogenes*) un *Fusobacterium necrophorum* izraisīta akūta pēcdzemdību (dzemdību) metrīta ārstēšanai 10 dienu laikā pēc dzemdībām. Indicēts tikai tādos gadījumos, kad ārstēšana ar citām antimikrobiālām zālēm nav bijusi veiksmīga.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, citām β-laktāma antibiotikām vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot gadījumos, kad jau ir zināma rezistence pret ceftiofūru vai citiem cefalosporīniem vai β-laktāma antibiotikām.

Nelietot intravenozām injekcijām.

Nelietot mājputniem (t.sk. olām), jo pastāv antibakteriālās rezistences izplatīšanās risks uz cilvēkiem.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dažiem liellopiem tika novērota tāda viegla iekaisuma reakcija kā audu tūska injekcijas vietā. Vairumam dzīvnieku klīniska uzsūkšanās novērojama 21 dienas laikā pēc injekcijas.

Var rasties ar devu nesaistītas pastiprinātas jutības reakcijas. Reizēm var rasties alerģiskas reakcijas (piemēram, ādas reakcijas, anafilakse).

Cūkām ir dažreiz novērota viegla reakcija injekcijas vietā, piemēram, fascijas vai tauku krāsas maiņa, kas saglabājas līdz pat 20 dienām pēc injekcijas. Ja novēro alerģiskas reakcijas, ārstēšana jāpārtrauc.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Cūkas un liellopi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Liellopiem:

Elpceļu slimību gadījumā: subkutāni 1 mg ceftiofūra/kg ķermeņa svara (ķ.sv.)/dienā 3 – 5 dienas, t. i., 1 ml/50 kg ķ.sv. katrā injekcijā.

Akūta starppirkstu nekrobakterioze: subkutāni 1 mg/kg ķ.sv./dienā 3 dienas, t. i., 1 ml/50 kg ķ.sv. katrā injekcijā.

Akūts pēcdzemdību metritis 10 dienu laikā pēc dzemdībām: subkutāni 1 mg/kg ķermeņa svara 5 dienas pēc kārtas, t. i., 1 ml/50 kg ķ.sv.katrā injekcijā.

Cūkām:

Intramuskulāri 3 mg ceftiofūra/kg ķ.sv./dienā 3 dienas, t. i., 1 ml/16 kg ķermeņa svara katrā injekcijā.

Ieteicamais maksimālais zāļu daudzums vienā injekcijas vietā ir 10 ml.

50 ml un 100 ml flakonus drīkst caurdurt ne vairāk kā 50 reizes. 250 ml flakonus drīkst caurdurt ne vairāk kā 85 reizes.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai nodrošinātu precīzu devu un izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas, ķermeņa svars jānosaka iespējami precīzāk.

Turpmākās injekcijas jāievada dažādās ķermeņa vietās.

Dažkārt akūta pēcdzemdību metrita gadījumā var būt nepieciešama papildus uzturošā terapija.

Pirms lietošanas enerģiski saskaliniet flakonu, lai zāles veidotu vienmērīgu suspensiju. Dažreiz flakona stikla krāsa var traucēt noteikt, vai zāles ir suspendētas. Pēc saskalināšanas, apgrieziet flakonu otrādi, lai pārlicinātos, ka vairs nav nogulšņu, ko vienmēr var skaidri redzēt caur flakona stikla apakšējo daļu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas.

Pienam: nulle stundas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt flakonā ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma un marķējumā pēc EXP. Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

“Cefenil RTU 50 mg/ml suspensijas injekcijām cūkām un liellopiem” lietošana var radīt risku cilvēku veselībai antimikrobās rezistences izplatīšanās dēļ.

“Cefenil RTU 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem” drīkst lietot tikai tādu klīnisko stāvokļu ārstēšanai, kad bijusi vai ir iespējama vāja organisma reakcija pret pirmās izvēles terapiju. Lietojot šīs zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. Pastiprināta zāļu lietošana, kā arī lietošana, neievērojot instrukcijā sniegtos norādījumus, var palielināt šādas rezistences veidošanos. Kad vien iespējams, “Cefenil RTU, 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem” drīkst lietot, tikai pamatojoties uz mikroorganismu jutības testu rezultātiem.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Šīs zāles izraisa rezistentu celmu veidošanos, piemēram, veidojas baktērijas, kas sintezē plaša spektra β-laktamāzes un var radīt risku cilvēka veselībai, ja šie celmi nokļūst cilvēka organismā, piemēram, ar pārtiku.

Šīs zāles ir paredzēts atsevišķu dzīvnieku ārstēšanai. Nelietot slimību profilaksei vai ganāmpulka veselības programmu ietvaros. Dzīvnieku grupu ārstēšana stingri jāierobežo. To drīkst veikt tikai slimību uzliesmojumu laikā atbilstoši apstiprinātiem lietošanas nosacījumiem.

Nelietot profilaksei placentas aiztures gadījumā.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, inhalācijas, uzņemšanas kopā ar pārtiku vai saskares ar ādu var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīnu var izraisīt krusteniskas reakcijas pret cefalosporīnu un otrādi. Atsevišķos gadījumos pret šīm vielām var būt smagas alerģiskas reakcijas.

1. Nerīkojieties ar šīm zālēm, ja jums ir pastiprināta jutība vai ja jums nav ieteicams strādāt ar šādām zālēm.
2. Strādājot ar šīm zālēm, esiet ļoti piesardzīgi, lai izvairītos no saskares, ievērojot visus ieteiktos drošības brīdinājumus.
3. Ja pēc šo zāļu lietošanas Jums attīstās tādi simptomi kā, piemēram, izsitumi uz ādas, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja rodas tādi nopietni simptomi kā sejas, lūpu vai acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties meklēt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Pēc šo zāļu lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas.

Grūsnība un laktācija:

Laboratoriskajos pētījumos laboratorijas dzīvniekiem netika konstatēta teratogēna, fetotoksiska vai maternotoksiska iedarbība vai aborts. Lietošanas drošums mērķa sugām grūsnības laikā nav noteikts. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Vienlaicīgi lietojot ar bakteriostatiskām antibiotikām (makrolīdus, sulfonamīdus un tetraciklīnus), β-laktāmu baktericīdās īpašības tiek neutralizētas.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Ceftiofūra zemā toksicitāte cūkām ir pierādīta, lietojot ceftiofūra nātrija sāli devās, kas 8 reizes pārsniedz ceftiofūra ieteicamo dienas devu, ievadot intramuskulāri 15 dienas pēc kārtas.

Pēc ievērojamas parenterālas pārdozēšanas liellopiem nenovēroja nekādas sistēmiskas toksicitātes pazīmes.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Veterinārās zāles nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

05/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.
Lietošanai dzīvniekiem.

Iepakojuma izmēri:

50 ml, 100 ml un 250 ml stikla vai augsta blīvuma polietilēna (ABPE) flakoni.

Katrs flakons aizvākots ar nitrila aizbāzni un noslēgts ar alumīnija vāciņu. 100 ml un 250 ml stikla flakoni iepakoti plastikāta aizsargplēvē, lai samazinātu saplīšanas iespēju.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Ceftiofūrs ir jaunākās paaudzes cefalosporīnu grupas antibiotika, kas ir aktīva pret daudzām grampozitīvām un gramnegatīvām baktērijām. Ceftiofūrs nomāc baktēriju šūnapvalka sintēzi, tādējādi uzrādot baktericīdas īpašības. β-laktāmi darbojas kavējot baktēriju šūnapvalka sintēzi. Šūnapvalka sintēze ir atkarīga no enzīmiem, ko sauc par penicilīnus saistošajiem proteīniem (PSP). Baktērijas izstrādā rezistenci pret cefalosporīnu grupas antibiotikām ar četrus mehānismu palīdzību: 1) izmainot vai iegūstot penicilīnu saistošos proteīnus, kuri ir nejutīgi pret citādi efektīvo β-laktāmu; 2) izmainot šūnu caurlaidību pret β-laktāmiem; 3) saražojot β-laktamāzes, kas sašķeļ molekulas β-laktāma gredzenu, vai 4) ja notiek aktīva izplūšana.

MARKĒJUMS
V/DCP/12/0046

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

100 ml un 250 ml flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefenil RTU 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofur hydrochloride

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Ceftiofūrs (hidrohlorīda veidā) 50 mg/ml

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml
250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas un liellopi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Cūkām:
Viena intramuskulāra injekcija 3 dienas pēc kārtas.

Liellopiem:
Viena subkutāna injekcija 3 – 5 dienas pēc kārtas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Liellopiem:
Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas.
Pienam: nulle stundas.

Cūkām:
Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP{mēnesis/gads}
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.
Pēc caurduršanas/atvēršanas izlietot līdz _____

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Uzglabāt flakonu ārējā kartona iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Šīs zāles nesatur pretmikrobu konservantus.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/12/0046

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

MARKĒJUMS

V/DCP/12/0046

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

50 ml flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cefenil RTU 50 mg/ml suspensija injekcijām cūkām un liellopiem
Ceftiofur hydrochloride

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Ceftiofurs (hidrohlorīda veidā) 50 mg/ml

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Cūkām:

Viena intramuskulāra injekcija 3 dienas pēc kārtas.

Liellopiem:

Viena subkutāna injekcija 3 – 5 dienas pēc kārtas.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas.

Pienam: nulle stundas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot { numurs }

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc caurduršanas/atvēršanas izlietot līdz _____

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.

9. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/12/0046

10. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.