

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
V/NRP/10/0031**

**Tabic M.B. putojošās tabletes ūdens šķīduma pagatavošanai vistām**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES  
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA  
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

ABIC POLSKA Sp. z o.o.  
63-100 ŚREM, ul. Szkolna 17  
Polija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Tabic M.B.** putojošās tabletes ūdens šķīduma pagatavošanai vistām

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viena vakcīnas deva satur:

**Aktīvā viela:**

Dzīvs, novājināts infekciozā bursīta vīruss, celms M.B.  $\geq 10^{2.5}$  EID\*<sub>50</sub>

\*50% olu inficējošā deva.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Broileru, vaislas putnu un dējējvistu vakcinācijai pret infekciozo bursītu (Gamboro slimību) teritorijās, kur sastopami virulenti infekciozā bursīta vīrusi un kur cāļiem varētu būt augsts līmenis maternālo antivielu.

Imunitātes iestāšanās: 2 nedēļas pēc vakcinācijas.

Imunitātes ilgums: 2 mēneši.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nav.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Nav novērotas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

**7. MĒRĶA SUGAS**

Vistas (broileri, vaislas putni un dējējvistas).

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES**

Lietošanai ar dzeramo ūdeni vai intraokulāri.

Broileri: vakcinēt vienu reizi 10-12 dienas vecus putnus. Vakcinējot vienu reizi, tiek nodrošināta laba broileru aizsardzība visā to audzēšanas laikā līdz pat nokaušanai (7-8 ned.).

Vaislas un dējējvistas: vakcinēt divas reizes 10-12 dienu vecumā un 6-8 nedēļu vecumā. Pēc tam imunizācija jāatkārto ar inaktivētu infekciozā bursīta vīrusa vakcīnu 18-20 ned. vecumā.

Sagatavojot suspensiju vakcinācijai, tablete no blistera jāizspiež vēsā, vārītā ūdenī. Jāpārlicinās, ka tablete ir pilnībā izšķīdusi, t. i., gāze pilnībā izdalījusies. Jānogaida 1-2 min, līdz tablete ir pilnībā izšķīdusi, pēc tam lēnām jāizmaisa, lai nodrošinātu vakcīnas viendabīgumu.

### Vakcinācija ar dzeramo ūdeni

Ieteicams nepieciešamo skaitu tablešu ielikt 1/5 ūdens, ko putni parasti izdzer vienas dienas laikā. Hlora neitralizēšanai dzeramajā ūdenī, jāizmanto komerciālie hlora neitralizētāji saskaņā ar instrukciju vai jāpievieno 50 ml vājpiena vai 5 g vājpiena pulvera uz 1 litru ūdens. Ielejot vājpienu, jāpagaida 5 min un tikai tad jāliek vakcīnas tabletes.

### **PIEZĪMES:**

1. Ieteicams putnus vakcinēt no rīta, lietojot aukstu ūdeni.
2. Jānodrošina pietiekams skaits dzirdinātavu, lai visi putni varētu saņemt ūdeni vienlaicīgi un izdzertu ūdeni ar vakcīnu 2-3 stundās.
3. Ūdenim un dzirdinātavām jābūt tīrām, tajās nedrīkst būt dezinfekcijas līdzekļa pārpalikumi.
4. 2 stundas pirms vakcinācijas jāpārtrauc ūdens piegāde.
5. Nedrīkst atsākt piegādāt ūdeni putniem, kamēr visa vakcīna nav izlietota.

### Vakcinācija iepilnot acī (intraokulāra ievadīšana)

Tabletēm jābūt izšķīdinātām vēsā, vārītā ūdenī šādās attiecībās: 1 tablete (1000 devas) izšķīdināma 30-50 ml ūdens (precīzs ūdens daudzums ir atkarīgs no pudelītes pilinātāja veida).

Vakcīnai pirms vakcinācijas jābūt labi izmaisītai. Ar pudelītes pilinātāju putnam okulāri jāievada viens piliens vakcīnas.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Dzīvās vakcīnas ir jutīgas pret gaisu, saules gaismu, karstumu, dezinfektantiem un mazgāšanas līdzekļiem, tāpēc vakcīna jāsargā no iepriekš minētajiem faktoriem.

Neizmantojot tabletes, kas atrodas bojātos blisteru nodaļījumos.

Nekarsēt ūdeni, kas satur vakcīnu.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nulle dienas.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī ( 2 – 8 °C ). Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izņemtas no blistera iepakojuma tabletes jāizlieto nekavējoties.

Derīguma termiņš pēc atšķaidīšanas vai sagatavošanas lietošanai saskaņā ar lietošanas instrukciju: izlietot nekavējoties.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Vakcinēt tikai klīniski veselus putnus, kuri necieš no stresa situācijām, piemēram, pārpildītiem būriem, pārkaršanas, atdzišanas, nepietiekamas barošanas utt.

Nepieciešams precīzi noteikt devu (izvairīties no mazākas devas ievadīšanas).

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Lai izvairītos no jebkādas mijiedarbības, jāpārtrauc dzeramā ūdens apstrāde vai dezinfekcija 24 stundas pirms vakcinācijas (ja vakcīna tiek ievadīta ar dzeramo ūdeni).

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Konstatēts, ka vakcīna ir droša vienu dienu veciem SPF (brīviem no specifiskiem patogēniem) cāļiem, ievadot okulāri 10 reizes lielāku devu nekā paredzēts.

## **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

## **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

06/2018

## **15. CITA INFORMĀCIJA**

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Lietošanai dzīvniekiem.