

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/DCP/19/0009**

**Catobevit** 100 mg/ml + 0,05 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, suņiem un kaķiem

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES  
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA  
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vācija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Catobevit** 100 mg/ml + 0,05 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, suņiem un kaķiem

*Butafosfan, cyanocobalamin*

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viens ml satur:

**Aktīvās vielas:**

Butafosfāns	100,00 mg
Ciānkobalamīns (vitamīns B12)	0,05 mg

**Palīgvielas:**

Fenols	4,00 mg
--------	---------

Rozā līdz sarkanīgi rozā šķīdums.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Vielmaiņas vai reproduktīvās sistēmas funkcionālu traucējumu atbalsta terapija, ja nepieciešama fosfora un ciānkobalamīna papildus lietošana.

Ar dzemdību periodu saistītu vielmaiņas traucējumu, tetānijas un parēzes (piena triekas) gadījumā šīs zāles jālieto attiecīgi papildus magnija un kalcija preparātiem.

Muskuļu darbības atbalstam fosfora un/vai ciānkobalamīna deficīta gadījumā.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām, vai pret kādu no palīgvielām.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Kaķiem pēc subkutānas injicēšanas starp lāpstiņām iespējamas reakcijas injekcijas vietā (pietūkums, tūska, apsārtums un audu sacietējums).

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai Jūs uzskatāt, ka zāles neiedarbojas, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu.

Iespējams ziņot arī nacionālā ziņošanas sistēmā, kas atrodama Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļa vietnē [www.pvd.gov.lv](http://www.pvd.gov.lv)

## 7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, zirgi, suņi un kaķi.

## 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ievadīšanas veids:

Liellopiem, zirgiem: intravenozi.

Suņiem un kaķiem: intravenozi, intramuskulāri, subkutāni.

Deva:

Dzīvnieku suga/ apakškategorija	Butafosfāns (mg/kg)	Vitamīns B12 (µg/kg)	Zāles (ml/kg)	Ievadīšanas veids
Liellopi	2,0-5,0	1,0-2,5	0,02-0,05	i.v.
Teļi	3,3-5,6	1,65-2,8	0,033-0,056	i.v.
Zirgi	2,0-5,0	1,0-2,5	0,02-0,05	i.v.
Kumeļi	3,3-5,6	1,65-2,8	0,033-0,056	i.v.
Suņi	2,5-25	1,0-2,5	0,025-0,25	i.v., i.m., s.c.
Kaķi	10-50	5-25	0,1-0,5	i.v., i.m., s.c.

Ja nepieciešams, drīkst ievadīt atkārtoti vienu reizi dienā.

## 9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Vāciņu drīkst droši caurdurt līdz 25 reizēm. Ja aizbāžņa caurduršana būs jāveic vairāk nekā 25 reizes, ieteicams izmantot atsevišķu šķīduma atvilkšanas adatu.

Suņu un kaķu ārstēšanai ieteicams izmantot 100 ml iepakojumu.

## 10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem, zirgiem:

Gaļai un blakuproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle stundas.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.  
Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.  
Uzglabāt pudelī ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.  
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz pudeles pēc EXP.  
Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.  
Derīguma termiņš pēc pirmās iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Ieteicams noskaidrot vielmaiņas vai reproduktīvās funkcijas traucējumu cēloni (cēloņus), lai noteiktu piemērotākos novēršanas un ārstēšanas pasākumus un nepieciešamību pēc fosfora un vitamīna B12 papildterapijas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret kādu no sastāvdaļām vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Zāles var nedaudz kairināt ādu vai acis. Tādēļ jāizvairās no to saskares ar ādu un acīm. Ja zāles nejauši nokļuvušas uz ādas vai acīs, noskalojiet ādu un/vai izskalojiet acis ar ūdeni.

Grūsnība un laktācija:

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums, lietojot tās grūsnām un laktējošām govīm, ķēvēm, kucēm un kaķenēm. Taču to lietošanai grūsnības un laktācijas laikā šīm sugām nevajadzētu radīt nekādas īpašas problēmas.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

## **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

## **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

04/2019

## **15. CITA INFORMĀCIJA**

100 ml II hidrolītiskās klases dzintarkrāsas stikla pudele ar brombutilgumijas aizbāzni, alumīnija vāciņu un noņemamu aizdari.

250 ml I hidrolītiskās klases dzintarkrāsas stikla pudele ar brombutilgumijas aizbāzni, alumīnija vāciņu un noņemamu aizdari.

Iepakojuma izmēri:

Kastīte ar vienu 100 ml pudeli.

Kastīte ar vienu 250 ml pudeli.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA "KRKA Latvija"

Tel.: 67338610

Fakss: 67338151

Recepšu veterinārās zāles.