

MARKĒJUMS
V/NRP/08/1717

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ UN TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Kaste/Burciņa/Muciņa 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1000 g, 1500 g, 3000 g

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Suramox 500 mg/g pulveris šķīduma iekšķīgai lietošanai pagatavošanai vistām
Amoxicillinum

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 g pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai satur:

Aktīvā viela:

Amoksicilīns (amoksicilīna trihidrāta veidā) 500 mg

Palīgviela:

Vanilīns 0,01 mg

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris šķīduma iekšķīgai lietošanai pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 g
100 g
200 g
500 g
1000 g
1500 g
3000 g

5. MĒRĶA SUGAS

Vistas (broileri).

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Iekšķīgai lietošanai ar dzeramo ūdeni.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.
Nelietot putniem, kuru olas izmanto vai paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 10 dienu laikā.

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas dzeramajā ūdenī: 24 stundas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

**12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO
ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuri veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

**13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI
IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA
PIEMĒROJAMI**

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Virbac S.A.
1ere Avenue 2065 m L.I.D.
06516 Carros
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/08/1717

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

MARKĒJUMS
V/NRP/08/1716

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ UN TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Maisiņi + LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

500 g, 1000 g, 2000 g, 3000 g

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Suramox 500 mg/g pulveris šķīduma iekšķīgai lietošanai pagatavošanai vistām
Amoxicillinum

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

1 g pulvera iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai satur:

Aktīvā viela:

Amoksicilīns (amoksicilīna trihidrāta veidā) 500 mg.

Palīgviela:

Vanilīns 0,01 mg.

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

500 g
1000 g
2000 g
3000 g

5. MĒRĶA SUGAS

Vistas (broileri).

6. INDIKĀCIJA(-S)

Pret amoksicilīnu jutīgu *Escherichia coli* izraisītu elpceļu infekciju novēršanai ganāmpulkā, kurā slimība ir konstatēta.

7. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot dzīvniekiem ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem vai citām β-laktāma grupas antibiotikām.

Nelietot dzīvniekiem ar nopietniem nieru bojājumiem, tostarp anūriju un oligūriju.

β-laktamāzi sintezējošu baktēriju klātbūtnē.

Nelietot zaķveidīgo kārtas dzīvniekiem un grauzējiem, piemēram, trušiem, jūrascūciņām, kāmjēm un smilšu pelēm.

Nelietot atgremotājdzīvniekiem un zirgiem.

Nelietot šīs zāles dējējvistām, kuru olas paredzēts lietot cilvēku uzturā.

8. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Penicilīnu un cefalosporīnu lietošana var izraisīt pastiprinātās jutības reakcijas. Dažkārt alerģiskās reakcijas pret šīm vielām var būt smagas.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nepieciešamo zāļu daudzumu pēc iespējas precīzāk jānosver, izmantojot atbilstoši kalibrētus svarus.

Zāles jāatšķaida ar nelielu daudzumu ūdens, lai iegūtu pagaidu šķīdumu, kuru pēc tam izšķīdina dzeramā ūdens tvertnē. Atslēdziet ūdens padevi tvertnei, līdz izlietots viss zāles saturošais šķīdums. Šāds atšķaidīšanas process ļauj iegūt homogēnāku gala šķīdumu. Koncentrēto šķīdumu var pagatavot arī ar ūdens dozatora palīdzību.

10. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai kopā ar dzeramo ūdeni.

20 mg amoksicilīna (trihidrāta veidā) uz kg ķermeņa svara dienā kopā ar dzeramo ūdeni (t.i., 400 mg zāļu Suramox uz 10 kg ķermeņa svara dienā), lietojot 5 dienas pēc kārtas.

Jānosaka pēc iespējas precīzāka deva uz ķermeņa svaru, lai novērstu pārāk mazas devas lietošanu.

11. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 1 diena.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Drīkst lietot, tikai pamatojoties uz mikroorganismu jutīguma pārbaudes rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jābalsta uz informāciju par vietējo epidemioloģisko situāciju attiecībā uz mērķa baktēriju jutīgumu.

Neatbilstoša zāļu lietošana var palielināt mikroorganismu rezistences pret amoksicilīnu izplatību un samazināt to iedarbību.

Lietojot šīs zāles jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pēc pašinjicēšanas, ieelpojot, norijot vai nonākot saskarē ar ādu, penicilīni un cefalosporīni var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var izraisīt krusteniskas pastiprinātas jutības reakcijas pret cefalosporīniem un otrādi. Dažkārt alerģiskās reakcijas pret šīm vielām var būt smagas.

Nelietojiet šīs zāles, ja zināt, ka esat alerģisks vai ja Jums ieteikts nestrādāt ar šādiem preparātiem.

Strādājiet ar šīm zālēm ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no saskares, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus. Ja pēc zāļu lietošanas Jums rodas tādi simptomi kā izsitumi uz ādas,

Jums jāmeklē medicīniska palīdzība un jāuzrāda šis brīdinājums ārstam. Tūska sejas, lūpu vai acu rajonā ir nopietnāki simptomi, un to gadījumā nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība.

Pagatavojot šķīdumu, lietojiet elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.

Nomazgājiet tās ādas daļas, kas bijušas pakļautas zaļu iedarbībai.

Zaļu lietošanas laikā izvairieties no to piesārņošanas.

Dēšanas periods:

Nelietot putniem, kuru olas izmanto vai paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Amoksicilīna baktericīdā darbība tiek neitralizēta, ja vienlaikus lieto zāles ar bakteriostatisku darbības mehānismu.

Nelietot vienlaikus ar neomicīnu, jo tas bloķē iekšķīgi uzņemtu penicilīnu uzsūkšanos.

Pārdozēšana:

Lietojot devu, kas 5 reizes pārsniedza ieteikto devu, blakusparādības netika novērotas.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc atvēršanas izlietot 10 dienu laikā.

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas dzeramajā ūdenī: 24 stundas.

14. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

15. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuri veterināro zāļu atkritumi ir jāznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

16. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

17. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

18. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Virbac S.A.

1ere Avenue 2065 m L.I.D.

06516 Carros

Francija

19. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/08/1717

20. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

**21. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA
APSTIPRINĀTA**

09/2018

22. CITA INFORMĀCIJA

-