

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/96/0442**  
**Multiject IMM suspensija ievadišanai tesmenī liellopiem**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Manufacturing Ltd.  
Rossmore Industrial Estate  
Monaghan  
Īrija

Norbrook Laboratories Limited  
Newry  
Co. Down, BT35 6JP  
Lielbritānija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Multiject IMM** suspensija ievadišanai tesmenī govīm

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

1 ml suspensijas satur:

**Aktīvās vielas:**

Prokaīna penicilīns	20 mg
Streptomicīna sulfāts	20 mg
Neomicīna sulfāts	20 mg
Prednizolons	2 mg

Balta eļļas suspensija.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Pret penicilīnu, streptomicīnu un neomicīnu jutīgu bakteriālas izcelsmes ierosinātāju izraisītu akūtu un subakūtu mastītu ārstēšanai slaucamām govīm.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.  
Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret penicilīniem, citām beta laktāma grupas vielām, prokaīnu vai pret kādu no palīgvielām.  
Nelietot gadījumos, ja ir beta laktamāzes producējošu patogēnu infekcija.

## **6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi (laktējošas govīs).

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES**

Lietošanai tesmenī vienreizējas infūzijas veidā.

Katrā slimajā tesmenī caur pupa kanālu jāievada viena injektora saturs, tūlīt pēc slaukšanas 1 reizi dienā 3 dienas pēc kārtas.

Ievērot aseptiku.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Nav.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Pienam: 108 stundas.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C

Daļēji izlietotos injektorus iznīcināt.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Kad vien iespējams, zāļu lietošana jāpamato ar ierosinātāja jutības testa rezultātiem. Ja tas nav iespējams, terapija jāpamato ar vietējo (reģionālo, saimniecības) epidemioloģisko informāciju par mērķa baktēriju jutīgumu.

Lietojo šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Lietojo šīs zāles, neievērojot zāļu aprakstā iekļautos norādījumus, pastāv krusteniskās rezistences risks - var veidoties pret benzilpenicilīnu rezistentu baktēriju pārsvars un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar citām beta laktāma vielām (penicilīnu vai cefalosporīnu).

Lietojo veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju izplatība, kuras rezistentas pret neomicīnu, un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem aminoglikozīdiem, līdz pat iespējamai krusteniskai rezistencei.

Ārstēšanas kurss jāveic veterinārārsta uzraudzībā.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:  
Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt pastiprinātu jutības reakciju (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var būt nopietnas alerģiskas reakcijas.

1. Personām, ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.
2. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.
3. Ja pēc saskares ar šīm zālēm Jums attīstās noteikti simptomi, piemēram, ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja rodas tādi nopietni simptomi kā sejas, lūpu un acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties meklēt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Mazgāt rokas pēc lietošanas.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot dzīvniekiem grūsnības un laktācijas laikā.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

04/2019

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.  
Lietošanai dzīvniekiem.