

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/NRP/00/1168**  
**Multimast Dry Cow suspensija ievadīšanai tesmenī govīm**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES  
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA  
DAŽĀDI**

Bimeda Animal Health Limited  
2 / 3 / 4 Airton Close  
Tallaght, Dublin 24  
Īrija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Multimast Dry Cow** suspensija ievadīšanai tesmenī govīm

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viens injektors (4,5 g) satur:

**Aktīvās vielas:**

Neomicīna sulfāts	100 mg
Penetamāta hidroiodīds	100 mg
Prokaīna benzilpenicilīns	400 mg

Viendabīga, pelēkbalta suspensija uz eļļas bāzes.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Subklīniska mastīta, ko izraisījuši pret neomicīnu un penicilīnu jutīgi mikroorganismi, ārstēšanai un novēršanai govīm cietstāves periodā.

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret beta laktāma antibiotikām, cefalosporīniem, neomicīnu vai pret kādu no palīgvielām.

Nelietot govīm laktācijas periodā.

Nelietot 50 dienu laikā pirms dzemdībām.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Aktīvās vielas zemās toksicitātes un lietošanas veida dēļ nav zināmas citas nevēlamās blakusparādības kā vien pastiprinātas jutības reakcijas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

**7. MĒRĶA SUGAS**

Liellopi (govis cietstāves periodā).

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES**

Ievadīšanai tesmenī.

Viena injektora saturs infūzijas veidā jāievada katra tesmeņa ceturkšņa pupa kanālā uzreiz pēc pēdējās slaukšanas laktācijas periodā.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Pirms zāļu lietošanas pupi rūpīgi jānotīra un jādezinficē, un jāuzmanās, lai novērstu piesārņojuma nokļūšanu uz injektora uzgaļa. Maigi masēt pupu un tesmeni, lai zāles labāk izplatītos. Pēc zāļu ievadīšanas ieteicams izmantot tescmens dezinficēšanas līdzekli šķīduma vai aerosola veidā.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Gaļai un blakusproduktiem: 28 dienas.

Pienam: 4 dienas pēc dzemdībām, ja govš cietstāves periods ir 50 dienas vai ilgāks.

54 dienas pēc pēdējās infūzijas, ja govš cietstāves periods ir līdz 50 dienām.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc EXP.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Zāles lietot, pamatojoties uz mikroorganismu, kuri ir izolēti no katras cietstāvei paredzētās govš tesmeņa ceturkšņa(-u) iegūtiem piena paraugiem, jutības pārbaudes rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jābalsta uz informāciju par vietējo (reģionālo, fermas līmeņa) epidemioloģisko situāciju attiecībā uz mērķa baktēriju jutīgumu.

Lietojot zāles neatbilstoši norādījumiem zāļu aprakstā, var paaugstināties pret benzilpenicilīnu rezistentu baktēriju izplatība un iespējamās krusteniskās rezistences dēļ var samazināties ārstēšanas ar citiem beta laktāma pretmikrobu līdzekļiem (penicilīni un cefalosporīni) efektivitāte.

Lietojot šīs zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Izvairīties no šo veterināro zāļu saskares ar ādu.

Penicilīnu un cefalosporīnu grupas antibiotikas var izraisīt pastiprinātu jutību (alerģiju) pēc saskares.

Pastiprināta jutība pret cefalosporīniem var izraisīt krusteniskas reakcijas pret penicilīniem vai otrādi.

Alerģiskās reakcijas pret šīm vielām dažreiz var būt ļoti smagas.

Izvairieties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm, ja Jums ir pastiprināta jutība pret tām vai Jums ieteikts nestrādāt ar kādu no to sastāvdaļām.

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāievēro visi ieteiktie piesardzības pasākumi.

Ja rodas izsitumi uz ādas pēc šo veterināro zāļu lietošanas, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Ja rodas tādi nopietni izsitumi kā sejas, lūpu un acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, nepieciešams nekavējoties meklēt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Grūsnība:

Nelietot 50 dienu laikā pirms dzemdībām.

Laktācija:

Nelietot laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Zāļu sistēmiska uzsūkšanās no tesmeņa ir minimāla, tādēļ mijiedarbības iespējamība ir neliela.

**13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

**14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

09/2019

**15. CITA INFORMĀCIJA**

Recepšu veterinārās zāles.