

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/11/0049
Bimastat suspensija iekšķīgai lietošanai liellopiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Bimeda Animal Health Limited
2, 3 & 4 Airton Close,
Tallaght, Dublin 24
Īrija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bimastat suspensija iekšķīgai lietošanai liellopiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvās vielas:

1 ml suspensijas satur:

Sulfadiazīns	150 mg
Neomicīns (nemomicīna sulfāta veidā)	25 mg

Palīgviela(s):

Metilparahidroksibenzoāts	2,0 mg
Propilparahidroksibenzoāts	0,2 mg
Karmoizīns E122	0,05 mg

4. INDIKĀCIJA(-S)

Caurejas ārstēšanai teļiem, pirms atgremošanas procesu sākšanās, ja caureja saistīta ar infekciju, ko izraisa pret sulfadiazīnu un neomicīnu jutīgi mikroorganismi.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.
Nelietot teļiem ar funkcionējošiem priekškuņģiem.
Nelietot kumeļiem un zirgiem.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā, lūdz, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (teļi pirms atgreimošanas funkcijas sākšanās).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Ieteicamā deva ir: 4 ml uz 10 kg ķermeņa svara divas reizes dienā. Tas atbilst 60 mg/kg sulfadiazīna un 10 mg/kg neomicīna divas reizes dienā.

Maksimālais ārstēšanas ilgums ir 5 dienas.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Pirms lietošanas kārtīgi saskalināt. Lai nodrošinātu atbilstošu devu, dzīvnieka svars jānosaka pēc iespējas precīzāk.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 28 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Dehidratētiem teļiem jāapsver vienlaicīga intravenoza šķīdumu terapija. Ja pēc 48 stundu ilgas ārstēšanas nav vērojama klīniska atbildes reakcija, jāapsver parenterāla antibiotiku terapija.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Lietojot šīs zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi. Zāles drīkst lietot, tikai pamatojoties uz mikroorganismu jutības testa rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšana jāpamato ar informāciju par vietējo (reģionālo, fermas līmeņa) epidemioloģisko situāciju attiecībā uz mērķa baktēriju jutību.

Nepārsniegt ieteikto devu vai ārstēšanas ilgumu. Neomicīna ilgstoša iekšķīga lietošana var izraisīt bakteriālas vai sēnīšu superinfekcijas.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Izvairīties no saskares ar ādu.

Pēc lietošanas nomazgāt rokas.

Laktācija:

Zāles paredzētas lietošanai tikai teļiem. Nelietot govīm laktācijas laikā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Pastāv mijiedarbība un antagonisms starp sulfonamīdiem un B grupas vitamīnu kompleksu. Ārstēšanas laikā nelietot prokaīna grupas vietējās anestēzijas līdzekļus, jo tie darbojas kā sulfonamīdu komponenta antagonisti.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Teļiem ir pierādīta laba panesība, lietojot devas, kas 3 un 5 reizes pārsniedz ieteikto devu.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.