

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/02/1442
Inmunair 17.5 suspensija iekšķīgai lietošanai vistām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

LABORATORIOS CALIER, S.A.

c/. Barcelones, 26 (Pla del Ramassa)

LES FRANQUESES DEL VALLES, (Barcelona)

Spānija

Tel: 93-849.5133 – Fax: 93-840.1398

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Inmunair 17.5 suspensija iekšķīgai lietošanai vistām

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml suspensijas satur:

Aktīvās vielas:

Inaktivētas *Cutibacterium acnes* (Propionibacterium acnes) baktērijas 0,17 mg

Escherichia coli baktēriju lipopolisaharīds 0,05 mg

Palīgvielas:

Tiomersāls 0,10 mg

4. INDIKĀCIJA(-S)

Vistām, broileriem, jaunputniem, dējējvistām un vaislas vistām:

Inmunair 17.5 palielina imunitāti pret Mareka slimību vakcinētiem putniem, lietojot to ar trīs nedēļu intervālu pēc vakcinācijas.

Zāles palielina aizsardzību pret infekciozā bursīta infekciju putniem.

Zootehniskajiem parametriem nodarīto kaitējumu samazināšanai, ko izraisa inficēšanās ar *Mycoplasma gallisepticum*.

Putnu mirstības un zootehniskajiem parametriem nodarīto kaitējumu samazināšanai, ko izraisa putnu leikozes vīrusa J serotipa infekcija.

Samazina bojājumus, ko rada infekciozā bursīta vīruss.

Ieteicams lietot putniem gadījumos, kad ir pastiprināta stresa ietekme un pastiprināta jutība pret infekcijas slimībām.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Vistas (broileri, dējējvistas, vaislas vistas).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Pievienot dzeramajam ūdenim devā 0,5-1 ml *Inmunair 17.5* uz 10 kg ķermeņa svara dienā, 3 dienas pēc kārtas.

Cāļiem minimālais lietošanas vecums ir pirmā dzīvības diena.

Devas:

Broileriem: lietot 0,5-1 ml zāļu/10 kg ķermeņa svara pirmajās 3 dzīves dienās. Var atkārtot 21 dienas vecumā.

Dējējvistām un vaislas vistām: lietot 0,5-1 ml zāļu/10 kg ķermeņa svara pirmajās 3 dzīves dienās. Atkārtoti lietot 10-12 un 18-23 nedēļu vecumā.

Pirms lietošanas zāles rūpīgi samaisīt ar dzeramo ūdeni.

Lietošana atkarīga no vakcinācijas programmas, stresa vai pasīvās imunitātes nepietiekamības.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Zāles izšķīdināt ūdens daudzumā, ko putni izdzer 2 stundu laikā, ņemot vērā putnu ķermeņa svaru un vecumu. Lai nodrošinātu pilnīgu paredzētās zāļu devas uzņemšanu, pirms tam ierobežot dzeramā ūdens padevi.

Sagatavoto zāļu saturošo ūdeni izlietot nekavējoties.

Ārstēšanas laikā visiem putniem nodrošināt neierobežotu piekļuvi zāles saturošajam ūdenim.

Pēc zāļu saturošā ūdens izdzeršanas, atjaunot tīra dzeramā ūdens padevi.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C).

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas saskaņā ar norādījumiem: 2 stundas.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: izlietot nekavējoties.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

05/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.