

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/02/1497

BIO-MD-VAC dziļi saldēta vakcīna ar šķīdinātāju injekcijām vistām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

FATRO S.p.A.
Via Emilia, 285
Ozzano Emilia (BO)
Itālija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BIO-MD-VAC dziļi saldēta vakcīna ar šķīdinātāju injekcijām vistām

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvā viela:

Viena vakcīnas deva satur:
Dzīvu, saldētu vistu herpes vīrusa celms CVI 988 (Rispens) ne mazāk kā 1500 PFU devā.

4. INDIKĀCIJAS

Cāļu profilaktiskai imunizācijai pret Mareka slimību.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

7. MĒRĶA SUGAS

Vistas (cāļi).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Deva 0,2 ml injicējot intramuskulāri kājas muskulatūrā.

Vakcīnas sagatavošana : Izņemiet vienu vakcīnas ampulu no šķidrā slāpekļa balona un to nekavējoties ievietojiet siltā (+25 °C) ūdenī. Sekojiet, lai ampulas saturs ir pilnīgi atlaidināts. Pēc tam ar sterilu

Šļirci pievienojiet 1 ampulas saturu (1000 devas) 200 ml šķīdinātāja, kam jābūt istabas temperatūrā. Ievelciet šļircē 1 ml šķīdinātāja un izskalojiet ampulu. Saskaliniet šķīdinātāja pudeli ar pievienoto vakcīnu. Tā ir sagatavota lietošanai.

Sagatavoto vakcīnu izlietot 2 stundu laikā.

Vakcinācijas programma: vakcināciju ieteicams veikt 1-2 dienu veciem cāļiem un, jebkurā gadījumā, nelietot pēc 7 dienu vecuma.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Vakcinācijas rezultāts uzlabojas, ja putni tiek turēti tīrās un dezinficētās telpās. Lai izvairītos no vīrusa izplatības, pirmajās dzīves nedēļās jāizvairās no putnu iespējamās saskares ar vecākiem putniem.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Vakcīnu uzglabāt šķidrā slāpekļī (-196 °C). Derīguma termiņš 18 mēneši.

Šķīdinātāju uzglabāt vēsā vietā.

Sagatavoto vakcīnu izlietot 2 stundu laikā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Dēšanas periods:

Nelietot putniem dēšanas periodā un 4 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

06/2015

15. CITA INFORMĀCIJA

Lietošanai dzīvniekiem.

Izplatīšana - tikai praktizējošam veterinārārstam.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA „Optim Vet”

Mētru iela 6,

Grobiņa, Grobiņas novads,

LV-3430, Latvija