

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/01/1373

Tirsan injection 250mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, sivēniem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:
FATRO S.p.A. – Via Emilia, 285 - Ozzano dell'Emilia (Bologna), Itālija.

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Tirsan injection 250mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, sivēniem
Thiamphenicolium

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1ml satur -

Aktīvā viela:

Tiamfenikols 250mg

Palīgvielas: līdz 1ml

4. INDIKĀCIJA(-S)

Salmonella spp., *Escherichia coli*, *Pasteurella* spp., *Clostridium* spp. un citu mikroorganismu izraisītas septicēmijas, zarnu infekciju, bronhopneimonijas, sekundāru infekciju, urīnizvadceļu infekciju, metrīta, piometras, mastīta, nagu infekciju un dermatītu ārstēšanai liellopiem, aitām, cūkām, sivēniem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀ BLAKUSPARĀDĪBAS

Iespējams imunoloģisko procesu nomākums. Tiamfenikols penetrē placentāro barjeru, tāpēc grūšņiem dzīvniekiem izraisa teratogēnu un fetotoksisku iedarbību.

Pārdozēšanas gadījumā iespējama mikrosēņu superinfekcija un/vai mikroorganismu disbalance organismā. Injekcijas vietā iespējama sāpju sajūta.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas, cūkas, sivēni.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODEDES

Devas:

- liellopiem, aitām un cūkām dienas deva sadalot divām ievadīšanas reizēm 10-20 ml/100kg ķermeņa svara (25-50 mg tiamfenikola/kg) intramuskulāri vai intravenozi;
- sivēniem dienas deva sadalot to divām ievadīšanas reizēm 2-4 ml/10kg ķermeņa svara (50-100 mg tiamfenikola/kg) intramuskulāri.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skat. 8. punktā.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 8 dienas.

Pienam: 48 stundas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt tumšā vietā istabas temperatūrā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Tiamfenikols penetrē placentāro barjeru un var izraisīt teratogēnu un fetotoksisku iedarbību grūsnības agrīnajās stadijās.

Pārdozēšanas gadījumā iespējama mikrosēņu superinfekcija un/vai mikroorganismu disbalance organismā. Injekcijas vietā iespējama sāpju sajūta.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

10/2015

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmēri: 40ml, 100ml, 250ml un 500ml. Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.

SIA "Optim Vet"

Mētru iela 6,

Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430

Latvija

