

MARKĒJUMS
V/NRP/99/0984

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Skārda vai alumīnija flakons 250 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Bolfo Tick and Flea Spray 2,5 mg/g uz ādas lietojams aerosols, šķīdums suņiem un kaķiem
Propoxur

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Propoksūrs (2-izopropoksifenil-metilkarbamāts) 2,5 mg/g

3. ZĀĻU FORMA

Uz ādas lietojams aerosols, šķīdums.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Suņiem un kaķiem blusu (*Ctenocephalides* spp.) un ērcu (*Ixodes ricinus*) invāzijas ārstēšanai un kontrolei vismaz 1 nedēļu.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ārīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Neizsmidzināt aerosolu dzīvniekam acīs, degunā vai uz citām gļotādām. Neizsmidzināt atklātas liesmas tuvumā vai uz karstiem priekšmetiem. Turēt drošā attālumā no uguns avotiem. Neieelpot aerosola tvaikus. Lietot tikai labi vēdināmās telpās.

Uzglabāt atsevišķi no pārtikas un barības.

Apstrādes laikā izvairīties no zāļu tiešas saskares ar acīm, ādu, muti un apģērbu.

Šīs veterinārās zāles satur karbamātu. Ja parādās saindēšanās pazīmes, lūdzu, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Lietojot šīs zāles neēst, nedzert un nesmēķēt.

Ja notikusi nejauša tā uzsmidzināšana uz ādas, nekavējoties mazgāt skarto vietu ar ūdeni un ziepēm; ja notikusi nejauša zāļu nokļūšana acīs, skalot acis ar lielu daudzumu ūdens.

Pēc apstrādes novilkt mitro apģērbu, rūpīgi nomazgāt rokas, skarto ādu un seju ar ziepēm un ūdeni. Lietošanas laikā neizsmidzināt uz citiem citām personām. Personām ar pastiprinātu jutību pret aktīvo vielu, propoksūru, vai kādu no palīgvielām, vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Ar Bolfo Tick and Flea Spray uz ādas izsmidzināmo aerosolu nedrīkst darboties sievietes grūtniecības trešajā trimestrī. Neļaut bērniem nonākt saskarē ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem, kamēr tie nav nožuvuši. Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Flakons ir zem spiediena un viegli uzliesmojošs. Sargāt no tiešiem saules stariem. Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C. Neatdzēsēt. Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻUVAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Aktīvā viela, propoksūrs, ir toksiska ūdenī dzīvojošiem organismiem, putniem un bitēm. Neļaut tikko apstrādātiem suņiem peldēties ūdenstilpēs, jo tas var apdraudēt ūdenī dzīvojošus organismus. Nepiesārņot ar veterinārajām zālēm vai to atkritumiem upes, ūdenstilpes, ūdensteces, dambjus un citus ūdens avotus.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen,
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/99/0984

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}