

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**  
**V/MRP/12/0060**  
**Cazitel Plus XL tabletes suņiem**

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,  
Loughrea,  
Co. Galway,  
Īrija

**2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Cazitel Plus XL** tabletes suņiem

**3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viena tablete ar aromatizētāju ar cūkgaļas garšu satur 175 mg prazikvantela, 504 mg pirantela embonāta (atbilst 175 mg pirantela) un 525 mg febantela.  
Dzeltenas iegarenas tabletes ar dalījuma līniju abās pusēs.  
Tableti var sadalīt divās vienādās daļās.

**4. INDIKĀCIJA(-S)**

Pieaugušiem suņiem: jauktu nematožu un cestozu invāziju ārstēšanai, ko ierosina šādas parazitū sugas:

**Nematodes:**

**Cērmes:** *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (pieauguši parazitīti un nenobriedušas kāpuru formas vēlā stadijā).

**Āķtārpi:** *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (pieauguši parazitīti).

**Matgalvji:** *Trichuris vulpis* (pieauguši parazitīti).

**Cestodes:**

**Lenteni:** *Echinococcus* sugas (*E. granulosus*, *E. multilocularis*), *Taenia* sugas (*T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniformis*), *Dipylidium caninum* (pieauguši parazitīti un nenobriedušas kāpuru formas).

**5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo var samazināties pirantela un piperazīna prettārpu iedarbība.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

**6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Ļoti retos gadījumos ir novēroti gastrointestināli traucējumi (caureja, vemšana).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par to savu veterinārārstu.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

## 7. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

## 8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Tikai iekšķīgai lietošanai.

Ieteicamās devas ir: 15 mg febantela/kg ķermeņa svara, 5 mg pirantela (atbilst 14,4 mg pirantela embonātam)/kg ķermeņa svara un 5 mg prazikvantela /kg ķermeņa svara. Tas atbilst 1 Cazitel Plus XL tabletei uz 35 kg ķermeņa svara.

Suņiem ar ķermeņa svaru > 35 kg jādod 1 Cazitel Plus XL tablete plus atbilstošs Cazitel Plus tablešu daudzums, kas ekvivalents 1 tabletei uz 10 kg ķermeņa svara.

Suņiem ar ķermeņa svaru apmēram 17,5 kg jādod ½ Cazitel Plus XL tabletes.

Tabletes var dot sunim tieši mutē vai piemaisīt barībai. Pirms vai pēc ārstēšanas badošanās nav nepieciešama.

Devu tabula:

Ķermeņa svars (kg)	Tabletes
Apmēram 17,5 kg	½ Cazitel Plus XL tabletes
31-35 kg	1 Cazitel Plus XL tablete
36-40 kg	1 Cazitel Plus XL tablete plus ½ Cazitel Plus XL tabletes
41-45 kg	1 Cazitel Plus XL tablete plus 1 Cazitel Plus tablete
46-50 kg	Cazitel Plus XL tablete plus 1½ Cazitel Plus tabletes
51-55 kg	1 Cazitel Plus XL tablete plus 2 Cazitel Plus tabletes
56-60 kg	1 Cazitel Plus XL tablete plus 2½ Cazitel Plus tabletes
61-65 kg	1 Cazitel Plus XL tablete plus 3 Cazitel Plus tabletes
66-70 kg	2 Cazitel Plus XL tabletes

Ja pastāv invāzijas atkārtotās risks, par atkārotas lietošanas nepieciešamību un biežumu konsultējieties ar veterinārārstu.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Lai nodrošinātu precīzas devas noteikšanu un izvairītos no pārāk mazas devas lietošanas, ķermeņa svars jānosaka iespējami precīzāk.

Derīguma termiņš tabletes pusēm: 14 dienas.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.

Derīguma termiņš attiecas uz pēdējo attiecīgā mēneša dienu.

Derīguma termiņš tabletes pusēm: 14 dienas.

Katru reizi, uzglabājot neizlietoto tabletes pusi, tā jāievieto blistera atvērtajā vietā un jāieliek atpakaļ kartona kastē.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo var samazināties pīrantela un piperazīna pretparazitārā iedarbība.

Vienlaicīga lietošana ar citiem holīnerģiskiem savienojumiem var izraisīt toksicitāti.

Invadēšanās ar lenteņiem noteikti atkārtosies, ja netiek iznīcināti to starpsaimnieki, piemēram, blusas, peles.

Ir ziņots par teratogēnu iedarbību aitām un žurkām, kas saistīta ar lielu febantela devu. Nav veikti pētījumi kucēm agrīnā grūsnības periodā. Zāļu izmantošana grūsnības laikā jāaskaņo ar atbildīgā veterinārārsta ieguvumu un riska novērtējumu. Neiesaka lietot kucēm pirmo 4 grūsnības nedēļu laikā. Nepārsniegt noteikto devu, ārstējot grūsnas kuces.

Jāpievērš uzmanība, lai izvairītos no tālāk minētās prakses, jo tā palielina rezistences veidošanās risku un tā rezultātā terapija var nebūt efektīva:

- pārāk bieža un atkārtota vienas un tās pašas prettārpu zāļu grupas lietošana ilgstošā laika periodā;
- zāļu lietošana pārāk mazās devās, kas var būt nepareizas ķermeņa svara novērtēšanas dēļ.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Pareizas higiēnas ievērošanas nolūkā personai, kura ievada tabletes tieši sunim mutē vai piemaisa tās suņa barībai, pēc tam jānomazgā rokas.

Tikai lietošanai dzīvniekiem.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem. Jautājiet savam veterinārārstam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

03/2020

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Kartona kaste ar 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250, 280, 300, 500 vai 1000 tabletēm.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.