

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/00/1116

Tetrasol 20% L.A. šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām

**1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES
TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA
DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Univet Ltd.
Yullyvin
Cootehill
Co.Cavan
Īrija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Tetrasol 20% L.A. šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām

Oxytetracycline

3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvā viela:

Oksitetraciklīns 200 mg
(atbilst 216 mg oksitetraciklīna dihidrāta)

Palīgviela(-s):

Nātrija formaldehīda sulfoksilāts 3 mg

Dzintarkrāsas līdz gaiši brūns šķīdums.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Pret oksitetraciklīnu jutīgu baktēriju izraisītu vispārēju un lokālu infekciju ārstēšanai liellopiem, aitām, cūkām.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.
Nelietot dzīvniekiem ar smagiem nieru vai aknu bojājumiem.
Neievadīt intravenozi.
Nelietot zirgiem, suņiem un kaķiem.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Injekcijas vietā ļoti reti var novērot pārejošu lokālu reakciju. Nevar pilnībā izslēgt alerģiskas vai anafilaktiskas reakcijas iespēju. Alerģiskas vai anafilaktiskas reakcijas gadījumā zāļu lietošanu

nekavējoties pārtraukt un griezties pie sava veterinārārsta, kas veiks atbilstošus terapiju (antihistamīns, asinsrites stabilizētāji).

Dzīvniekiem ar viegli pigmentētu ādu tiešo saules staru iedarbība ārstēšanas laikā ļoti reti var izraisīt fotodermatītu.

Oksitetraciklīns var kavēt kalcifikāciju un/vai izraisīt zobu pigmenta iekrāsošanos dzeltenīgi brūnā krāsā. Šī iemesla dēļ tetraciklīnu dzīvniekiem zobu attīstības periodā un grūsnēm dzīvniekiem grūsnības beigu periodā lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas, cūkas

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Dziļai intramuskulārai injekcijai.

Deva liellopiem, aitām, cūkām: vienreizējai injekcijai 20 mg oksitetraciklīna/kg ķermeņa svara (atbilst 1 ml zāļu/10 kg ķermeņa svara).

Ja nepieciešams, injekciju atkārtot pēc 4 dienām liellopiem un aitām, pēc 3 dienām cūkām.

Ieteicamās devas:

liellopiem	10,0 ml / 100 kg
teļiem	5,0 ml / 50 kg
aitām	2,5 ml / 25 kg
jēriem	1,0 ml / 10 kg
sivēniem	0,5 ml / 5 kg
atšķirti sivēniem	2,0 ml / 20 kg
nobarojamām cūkām / sivēnmātēm	7,5 ml / 75 kg

Vienā injekcijas vietā neievadīt vairāk kā 20 ml liellopiem, 5 ml aitām un 10 ml cūkām.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Dzīvnieka ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk, lai nodrošinātu precīzu devu un izvairītos no nepietiekamas devas ievadīšanas.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem, aitām, cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 28 dienas.

Liellopiem:

Pienam: 7 dienas.

Nelietot aitām, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas norādīt flakona atvēršanas dienu uz marķējuma tam paredzētajā vietā.

Nelietot, šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Šo veterināro zāļu lietošana jāpamato ar no dzīvnieka izolētu baktēriju jutības testu rezultātiem. Ja tas nav iespējams, ārstēšanu pamatot ar vietējiem (reģiona, saimniecības līmeņa) epidemioloģiskajiem datiem par baktēriju jutību. Ja 3 dienu laikā pēc ārstēšanas uzsākšanas nenovēro acīmredzamu terapeitisko iedarbību, atkārtot zāļu jutības testu. Ja nepieciešams, jāapsver terapijas maiņa.

Lietojojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju izplatība, kuras rezistentas pret oksitetraciklīnu, un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar citiem tetraciklīniem līdz pat iespējamai krusteniskai rezistencei.

Lietojojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Šīs veterinārās zāles satur dimetilacetamīdu (DMAC), tādēļ izvairīties no zāļu saskares ar ādu un pēc lietošanas mazgāt rokas. Ja notikusi zāļu nokļūšana acīs, nekavējoties skalot acis ar aukstu ūdeni 15 minūtes. Ja parādās kairinājuma pazīmes, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) pašinjekcija, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Grūsnība:

Nav ieteicams lietot trešajā grūsnības trimestrī, jo tetraciklīni var izraisīt zobu iekrāsošanos un kavēt kalcifikāciju.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Oksitetraciklīnu nedrīkst ievadīt vienlaicīgi ar citām pretmikrobām vielām. Potenciāls tetraciklīnu antagonisms ar baktericīdas iedarbības antibiotikām.

Muskuļu relaksanti un narkotiskie līdzekļi var pastiprināt neiromuskulārās blokādes (respiratorā paralīze). Oksitetraciklīns ir heparīnam līdzīgo antikoagulantu antagonists.

Nelietot vienlaicīgi ar polivalentiem katjoniem (Ca, Mg, Fe), jo samazinās to uzsūkšanās spēja.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Akūtu tetraciklīna toksicitāti novēro reti.

Nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

03/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Iepakojuma izmērs: 100 ml, 12 x 100 ml.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.